

编者的话

数学课外读物对于帮助学生学好数学，扩大他们的数学知识领域，是很有好处的。近年来，越来越多的中学学生和教师，都迫切希望出版更多的适合中学生阅读的通俗数学读物。我们约请一些数学工作者，编了这套“数学小丛书”，陆续分册出版，来适应这个要求。

这套书打算介绍一些课外的数学知识，以扩大学生的知识领域，加深对数学基础知识的掌握，引导学生独立思考，理论联系实际。

这是我们的初步想法和尝试。热切地希望数学工作者和读者对我们的工作提出宝贵的意见和建议，更希望数学工作者为中学生写出更多更好的数学课外读物。

北京市数学会

1962年4月

目 次

一 引言.....	3
二 $H \leq G \leq A$	6
三 几个有趣的应用.....	19
四 几个简单的不等式.....	29
五 署平均.....	37
六 加权平均.....	49
附录 习题解答或提示.....	63

— 引　　言

“平均每人……”

“平均每亩……”

“这个球队队员的平均年龄……”

“某工厂的平均日产量……”

无论是听广播、看报纸或者和周围的人们交谈，在日常生活中差不多每天都要遇到“平均”这样一个词儿。每次听到或讲到这两个字的时候，实际上我们都是在无意之中走近了一大堆有趣的数学问题的边缘。正是由于我们对“平均”这个词儿太熟悉了，觉得没有必要去进一步思索它的全部含义，所以每次接触到这些数学问题时，我们又漫不经心地离开了它们，没有发觉到它们的存在。

其实我们很需要追究一下：为什么人们常要和“平均”这个词儿打交道呢？

让我们来看一些例子。

如果有人把某公社的一千亩土地中每亩的产量都告诉你，你能对这公社的生产情况作出什么结论吗？恐怕你除了感到听得很疲倦外，什么结论也得不到。因为他告诉你的资料太琐碎了。相反，如果他很简单地对你讲，这一千亩土地“平均”亩产多少，那你立刻可对这个公社的生产情况作出结论。同样，为了要说明某个工厂的生产情况，我们常常要用到

“平均日产量”、“平均月产量”这些名詞。

从上面的例子看來，如果要对某些事物从某些数量方面作一个概括性的了解，那么不可避免地要碰到“平均”这个概念，而在很多情况下，这种概括性的了解又是十分必要的。这或許就是我們所以常要和“平均”这詞儿打交道的原因了。

那么怎样算出上面所講的平均值呢？这个問題恐怕小学生也会回答。如果要計算一千亩土地的平均产量，只須把每亩的产量一起加起来，再用 1000 去除一下就行了。一般來說，假設已給 n 个数

$$a_1, a_2, \dots, a_n,$$

为了計算它們的平均值，只須把这 n 个数一起加起来，再用 n 去除一下，得

$$A = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n},$$

我們把数 A 叫做这 n 个数 a_1, a_2, \dots, a_n 的算术平均。

可是我們根据什么理由，可以認為这样得出的数 A 就是我们所要求的平均值呢？原来这里边是有一层道理的。当我们們定义一組数

$$a_1, a_2, \dots, a_n$$

的平均值 x 的时候，按照我們刚才講的意思，这个平均值 x 要能反映这組数的总的情况，我們总是希望 x 和这 n 个数的偏差

$$x - a_1, x - a_2, \dots, x - a_n$$

在总体上說来尽可能地小。也就是说，我們要适当地选取 x 值，使得平方和

$$D = (x - a_1)^2 + (x - a_2)^2 + \dots + (x - a_n)^2$$

达到它的最小值。这里我們不直接把这 n 个差数本身相加，而把它們的平方相加，是因为这些差数，有些是正值，有些是負值，直接相加，就会正負相消，不能反映总体的情况。

現在我們來求使 D 取得最小值的 x 值。經過簡單的变形之后，上式可以写成：

$$\begin{aligned} D &= nx^2 - 2(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)x + (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2) \\ &= n \left[x^2 - 2 \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} x + \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right)^2 \right] \\ &\quad - n \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right)^2 + (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2) \\ &= n \left(x - \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \right)^2 - \frac{(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2}{n} \\ &\quad + (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2). \end{aligned}$$

在最后的式子中，末二項是和 x 无关的常数；只有第一項和 x 有关，而且永远不会是負数。因此只有当第一項等于零时， D 的值最小。也就是说，为了使 D 取最小值，必須有

$$x = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$$

才行。算术平均的意义就在于此。

上面只是介紹了在我們生活中常用的計算平均值的方法。事实上，求平均的方法远不止一种，在各种不同的具体問題中，根据各种不同的具体条件，为了各种不同的具体目的，我們經常需要采用各种不同的方法去求各种不同数据的平均值。既然求平均值的方法有許多种，那么对同一組数，采用不同的方法所得平均值之間的关系又怎样呢？

在这本小書中，我們打算环绕“平均”这个概念講述一些

有趣的数学問題。

二 $H \leq G \leq A$

上面已經提到，求平均的方法不止一种。刚才我們把 n 个数相加，然后用 n 来除得到了这 n 个数的算术平均。自然我們也可把 n 个数相乘，然后把乘积开 n 次方，这样我們又得到了另一种平均，叫做这 n 个数的**几何平均**。說得詳細些，就是任給 n 个非負实数

$$a_1, a_2, \dots, a_n,$$

我們把

$$G = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$$

叫做这 n 个数的**几何平均**。

“几何平均”这个名詞的来源可以从下述简单的几何事實中得到解釋。如图 1，我們把两个数 a_1, a_2 看成是两个綫段的长度，并以它們做邊作一長方形。如果我們想作一正方形，使




图 1.

它的面积等于長方形的面积，那么它的邊長就是 a_1 和 a_2 这两个数的几何平均 $\sqrt{a_1 a_2}$ 。

除了上面的算术平均和几何平均外，我們还可定义另外一种平均。任給 n 个正的实数 a_1, a_2, \dots, a_n ，我們先求它

們倒數的算術平均

$$\frac{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n},$$

然后再作這個平均值的倒數：

$$H = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}},$$

這樣得到的數 H 稱為 a_1, a_2, \dots, a_n 的調和平均。

很容易看出，上面定義的三種平均都具有下面兩個簡單性質：

(一) 如果 n 個原始數據彼此相等，即

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = a,$$

那麼它們的算術平均、幾何平均、調和平均也都等於 a ，即

$$A = G = H = a.$$

(二) 如果 n 個原始數據都界於 m 和 M 之間，即

$$m \leq a_i \leq M \quad (i=1, 2, \dots, n),$$

那麼它們的算術平均、幾何平均、調和平均也都界於 m 和 M 之間，即

$$m \leq A \leq M, \quad m \leq G \leq M, \quad m \leq H \leq M.$$

特別，如果用

$$\max(a_1, a_2, \dots, a_n), \quad \min(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

記 a_1, a_2, \dots, a_n 中最大的和最小的（例如 $a_1=1, a_2=3, a_3=6, a_4=5$ ，那麼 $\max(a_1, a_2, a_3, a_4)=6, \min(a_1, a_2, a_3, a_4)=1$ ），那麼顯然有

$$\min(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq a_i \leq \max(a_1, a_2, \dots, a_n) \quad (i=1, 2, \dots, n),$$

所以有 $\min(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq A \leq \max(a_1, a_2, \dots, a_n),$

$$\min(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq G \leq \max(a_1, a_2, \dots, a_n),$$

$$\min(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq H \leq \max(a_1, a_2, \dots, a_n),$$

即一組數的算術平均、幾何平均和調和平均總是夾在這組數的最大值和最小值之間。

這兩个性質的證明留給讀者作練習。

定义了上述三种平均值以后，首先使我們感到关心的是这三种平均值之間的关系。它們之間哪个大些，哪个小些？或者它們間根本就不存在一定的規律：对某些數來說， A 比 G 大，而对另外一些數來說 G 又比 A 大？

为了获得启发，我們从最简单的情况研究起。先考慮只有两个数 a_1, a_2 的情形。我們知道，对任意两个实数 x 和 y ，永远有不等式：

$$(x-y)^2 \geq 0,$$

展开后即得 $xy \leq \frac{x^2+y^2}{2}.$ (1)

令 $x = \sqrt{a_1}, y = \sqrt{a_2}$ ，得

$$\sqrt{a_1 a_2} \leq \frac{a_1 + a_2}{2}. \quad (2)$$

再在(1)中令 $x = \frac{1}{\sqrt{a_1}}, y = \frac{1}{\sqrt{a_2}}$ ，那就有

$$\frac{1}{\sqrt{a_1 a_2}} \leq \frac{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2}}{2},$$

取倒数即得 $\frac{2}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2}} \leq \sqrt{a_1 a_2}.$ (3)

把不等式(2)、(3)联合起来便得：

$$\frac{2}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2}} \leq \sqrt{a_1 a_2} \leq \frac{a_1 + a_2}{2}. \quad (4)$$

不等式(4)告訴我們，对两个数來說，算术平均最大，几何平均次之，調和平均最小。原来它們之間是有一定的規律的。

这个結論使人們有理由猜測：对任意 n 个正数來說，这样的規律——算术平均最大，几何平均次之，調和平均最小——也是存在的。

定理一 对任意 n 个正数來說，永远有

$$H \leq G \leq A.$$

證明 以 $A(a_1, a_2, \dots, a_n), G(a_1, a_2, \dots, a_n), H(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 分別表示 n 个正数 a_1, a_2, \dots, a_n 的算术平均、几何平均和調和平均。先証

$$G(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq A(a_1, a_2, \dots, a_n). \quad (5)$$

我們把証明分成两部分：先对 $n=2^m$ 这种形状的数來証明不等式(5)，然后再在这个基础上証明 n 是任何自然数的情形。

上面我們已經証明了 $n=2$ 时(5)是成立的，即

$$G(a_1, a_2) \leq A(a_1, a_2),$$

由此不難推出 $n=4$ 时(5)也成立：

$$G(a_1, a_2, a_3, a_4)$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt[4]{a_1 a_2 a_3 a_4} = \sqrt{\sqrt{a_1 a_2} \sqrt{a_3 a_4}} \leq \frac{\sqrt{a_1 a_2} + \sqrt{a_3 a_4}}{2} \\ &\leq \frac{\frac{a_1 + a_2}{2} + \frac{a_3 + a_4}{2}}{2} = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_4}{4} = A(a_1, a_2, a_3, a_4). \end{aligned}$$

同样的方法可用来証明 $n=2^m$ 时(5)的正确性。对 m 进行数学归纳法。 $m=1, 2$ 时(5)是成立的，今設 $m=k$ 时(5)成立，则当 $m=k+1$ 时，

$$G(a_1, a_2, \dots, a_{2^{k+1}})$$

$$\begin{aligned} &= \sqrt[2^{k+1}]{a_1 a_2 \cdots a_{2^k} \cdot a_{2^k+1} \cdots a_{2^{k+1}}} \\ &= \sqrt[2^k]{\sqrt[2]{a_1 a_2 \cdots a_{2^k}} \sqrt[2]{a_{2^k+1} \cdots a_{2^{k+1}}}} \\ &\leq \frac{1}{2} \left(\sqrt[2^k]{a_1 a_2 \cdots a_{2^k}} + \sqrt[2^k]{a_{2^k+1} \cdots a_{2^{k+1}}} \right) \\ &\leq \frac{1}{2} \left(\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2^k}}{2^k} + \frac{a_{2^k+1} + \cdots + a_{2^{k+1}}}{2^k} \right) \\ &= \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{2^{k+1}}}{2^{k+1}} = A(a_1, a_2, \dots, a_{2^{k+1}}). \end{aligned}$$

也就是说， $m=k+1$ 时(5)成立。于是由数学归纳法的原理知道，对 $n=2^m$ 形状的数，(5)是正确的。

現在假設 n 不等于 2 的幂次，我們总可以找到一个适当的自然数 r ，使得 $n+r$ 是 2 的幂，就是使得

$$n+r=2^m$$

(例如, 当 $n=5$ 时, 可取 $r=3$, 就得 $n+r=8=2^3$; 当然也可取 $r=11$, 使 $n+r=16=2^4$). 这样一来, 对自然数 $n+r$ 而說, (5)便成立了. 命

$$A = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n},$$

那么

$$nA = a_1 + a_2 + \cdots + a_n,$$

为了利用刚才証明的結果, 在 n 个数

$$a_1, a_2, \cdots, a_n$$

之外再补充 r 个 A , 于是便得 $n+r$ 个数:

$$\underbrace{a_1, a_2, \cdots, a_n}_{n+r \text{ 个}}, \overbrace{\underbrace{A, A, \cdots, A}_{r \text{ 个}}},$$

对这 $n+r$ 个数來說, 我們有:

$$\begin{aligned} \sqrt[n+r]{a_1 a_2 \cdots a_n \underbrace{AA \cdots A}_{r \text{ 个}}} &\leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n + A + \overbrace{A + \cdots + A}^{r \text{ 个}}}{n+r} \\ &= \frac{nA + rA}{n+r} = A, \end{aligned}$$

不等式两边自乘 $n+r$ 次, 便有:

$$a_1 a_2 \cdots a_n A^r \leq A^{n+r},$$

两端同用 A^r 除之后再开 n 次方, 便得

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq A.$$

也就是說, 当 n 不是 2^m 这种形式时, 不等式 $G \leq A$ 也成立. 綜合上面兩段証明, 便知对任何自然数 n ,

$$G \leq A$$

永远成立。

現在再来証明不等式的第二部分

$$H \leq G,$$

便沒有原則性的困難了。在不等式

$$\sqrt[n]{b_1 b_2 \cdots b_n} \leq \frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n}$$

中命 $b_1 = \frac{1}{a_1}, b_2 = \frac{1}{a_2}, \dots, b_n = \frac{1}{a_n}$, 立得

$$\frac{1}{\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}} \leq \frac{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n},$$

两边取倒數即得：

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n},$$

也就是 $H \leq G.$

定理一到这里全部証毕。

从証明的过程可以看出，定理一虽然包含两个不等式：

$$G \leq A \text{ 和 } H \leq G,$$

但証明的主要困难是在前者，后者可以从前者簡單地推出。

由于这个定理的重要性，数学家們对它作出了各种各样不同的証明，这些証明体现了很多巧妙的想法。这里我們再介紹另外两个有趣的証明。

十九世紀法國大数学家哥西 (Cauchy) 利用倒推归纳法的原理来証明不等式 $G \leq A$ 。

大家知道，普通的数学归纳法原理是这样說的：如果

- (i) 命題 $P(n)$ 當 $n=1$ 時成立；
(ii) 从命題 $P(n)$ 的正確性能推出命題 $P(n+1)$ 的正確性，

那麼命題 $P(n)$ 便對任何自然數 n 都成立。

所謂倒推歸納法却是從下面兩條來推斷命題 $P(n)$ 對全部自然數 n 的正確性：

- (i') 命題 $P(n)$ 對無窮個自然數 n 成立。
(ii') 从命題 $P(n)$ 的正確性能推出命題 $P(n-1)$ 的正確性。

不等式(5)所以能用倒推歸納法，那是因為我們已對 $n=2^m$ 這種形狀的數證明了(5)是正確的，也就是說，我們已經對無窮個自然數

$$n = 2, 4, 8, 16, 32, \dots, 2^m, \dots$$

證明了它的正確性。現在假定對 n 個數命題已經成立，我們要由此推出對 $n-1$ 個數命題也真，即

$$\sqrt[n-1]{a_1 a_2 \cdots a_{n-1}} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}}{n-1}.$$

令 $b = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}}{n-1}$ ，

那麼 $a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} = (n-1)b$ 。

由歸納法的假定，對

$$a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, b$$

這 n 個數不等式(5)是成立的，于是有

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_{n-1} b} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} + b}{n} = \frac{(n-1)b + b}{n} = b,$$

不等式两端自乘 n 次得：

$$a_1 a_2 \cdots a_{n-1} b \leq b^n,$$

两端同用 b 除后再开 $n-1$ 次方，即得：

$$\sqrt[n-1]{a_1 a_2 \cdots a_{n-1}} \leq b,$$

即 $\sqrt[n-1]{a_1 a_2 \cdots a_{n-1}} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1}}{n-1}.$

这样便完成了倒推归纳法的证明。从而不等式(5)对任何自然数 n 都成立。

上面介绍的两种证法虽然在形式上不一样，但它们有共同的出发点：它们都利用了比较容易证明的事实—— $n=2^m$ 时命题的正确性。下面要讲的第三种证明却是从另一种巧妙的想法出发的。

设 a_1, a_2, \dots, a_n (6)

是已给的 n 个正数，我们要证

$$G(a_1, a_2, \dots, a_n) \leq A(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

如果 n 个数 a_1, a_2, \dots, a_n 彼此都相等，那么根据前面所讲的性质(一)(见第 7 页)知道 $G=A$ ，定理便无需证明了。因此不妨假定这 n 个数中至少有两个是不相等的。于是其中必有一个最大的和一个最小的，不妨设 a_1 是最大的， a_2 是最小的。这时我们有：

$$G = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} < \sqrt[n]{a_1 a_1 \cdots a_1} = a_1,$$

$$G = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} > \sqrt[n]{a_2 a_2 \cdots a_2} = a_2,$$

即 $a_2 < G < a_1$

或者 $(G - a_1)(G - a_2) < 0$. (7)

現在我們把原来 n 个数

$$a_1, a_2, \dots, a_n$$

换成一組新的数

$$a'_1, a'_2, \dots, a'_n, \quad (6')$$

其中

$$a'_1 = G, a'_2 = \frac{a_1 a_2}{G}, a'_3 = a_3, a'_4 = a_4, \dots, a'_n = a_n,$$

这儿的 G 就是原来 n 个数的几何平均。設这組新数的几何平均是 G' , 算术平均是 A' , 那么

$$\begin{aligned} G' &= \sqrt[n]{a'_1 a'_2 \cdots a'_n} = \sqrt[n]{G \cdot \frac{a_1 a_2}{G} a_3 \cdots a_n} \\ &= \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = G, \end{aligned}$$

也就是說新數組的几何平均和原来的一样。为了比較新旧數組算术平均的大小, 我們考慮二者的差

$$\begin{aligned} A' - A &= \frac{a'_1 + a'_2 + a'_3 + \cdots + a'_n}{n} - \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n}{n} \\ &= \frac{1}{n} (a'_1 + a'_2 - a_1 - a_2) = \frac{1}{n} \left(G + \frac{a_1 a_2}{G} - a_1 - a_2 \right) \\ &= \frac{1}{nG} \left[G^2 - (a_1 + a_2) G + a_1 a_2 \right] \\ &= \frac{1}{nG} (G - a_1)(G - a_2), \end{aligned}$$

由(7)立得

$$A' - A < 0,$$

即

$$A' < A.$$

這說明新數組的算术平均要比原来的小。

通过上面的手續, 我們从數組

$$a_1, a_2, \dots, a_n \quad (6)$$

造出了一組新的數

$$a'_1, a'_2, \dots, a'_n, \quad (6')$$

這組新的數有下面三個性質：

- (i) $G' = G$, 即幾何平均沒有改變;
- (ii) $A' < A$, 即算術平均比原來的小了;
- (iii) $a'_1 = G$, 即新數組中有一個數就是原來數組的幾何平均。

如果新數組 (6') 中的數彼此都相等, 那麼根據前面所講的性質(i) (見第 7 頁) 知道:

$$G' = A',$$

再由 (i) 和 (ii) 卽得

$$G < A,$$

定理就得到了證明。因此不妨再假定 (6') 中至少有兩個數不一樣, 那麼其中必有一個最大的, 一個最小的。於是我們可用和上面完全一樣的辦法從 (6') 造出另一組新數:

$$a''_1, a''_2, \dots, a''_n, \quad (6'')$$

它們的算術平均和幾何平均分別記為 A'' 和 G'' 。利用和上面一樣的推論, 易知

$$G'' = G', \quad A'' < A'.$$

同時 (6'') 中又多了一個 G , 也就是說 (6'') 中至少有兩個數是 G 了。

同樣的手續進行若干次(最多 $n-1$ 次)以後, 一定可把新數組中的數全部換成 G 。不妨設在第 m ($m \leq n-1$) 次時已把全部數換成 G 了。這時得新數組:

$$a_1^{(m)}, a_2^{(m)}, \dots, a_n^{(m)}. \quad (6^{(m)})$$

分別用 $A^{(m)}$ 和 $G^{(m)}$ 記它們的算术平均和几何平均。于是我們有

$$\begin{aligned} G^{(m)} &= G^{(m-1)} = \dots = G' = G, \\ A^{(m)} &< A^{(m-1)} < \dots < A' < A, \end{aligned} \quad (8)$$

而且这时 $(6^{(m)})$ 中的 n 个数全部都是 G 了。因此

$$A^{(m)} = \frac{a_1^{(m)} + a_2^{(m)} + \dots + a_n^{(m)}}{n} = \frac{G + G + \dots + G}{n} = \frac{nG}{n} = G.$$

把这个結果代入 (8)，立刻得

$$G < A,$$

这就是我們要証的結果。

这个証明的构思是比较巧妙的。它通过造新數組的办法，把原數組逐次化簡，最后使其中所有的数都彼此相等（这时几何平均等于算术平均），而在化簡的过程中它始終使几何平均不变，而讓算术平均逐次減小，化到最后一步时，定理就显然了。这种想法可用式子表示为：

$$\begin{array}{c} G = G' = G'' = \dots = G^{(m-1)} = G^{(m)} \\ \parallel \\ A > A' > A'' > \dots > A^{(m-1)} > A^{(m)} \end{array}$$

根据上面这种想法，讀者不難給出这个定理的另一个証明：我們也設法化簡原數組，使它最后 n 个数彼此相等，但在化簡过程中，使它的算术平均不变，而讓几何平均逐次增大。可用式子表示为：

$$\begin{array}{c} G < G' < G'' < \dots < G^{(m-1)} < G^{(m)} \\ \parallel \\ A = A' = A'' = \dots = A^{(m-1)} = A^{(m)} \end{array}$$

具体的作法留給讀者作練習。

上述那种證明定理的想法在數學的其他問題中也常被用到。

定理一的不等式中還有一個問題值得研究，那就是在什麼情況下等號成立的問題。顯然，如果 n 個數彼此都相等，即

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = a,$$

那麼

$$H = G = A.$$

現在的問題是，如果

$$G = A,$$

是否一定有

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n$$

呢？答案是肯定的。事實上，在定理一的最後一種証法中，我們早就得到這個結論了。

讀者不妨回憶一下：我們從

$$a_1, a_2, \cdots, a_n$$

中至少有兩個數不相等的假定出發，最後得到的結論是

$$G < A,$$

因此如果已知

$$G = A$$

的話，那麼當然所有的數都必須彼此相等了。綜合這兩結果，定理一可完整地敘述為：對任意 n 個正數

$$a_1, a_2, \cdots, a_n$$

來說，永遠有

$$H \leq G \leq A,$$

其中等號當並且只當 n 個數彼此相等，即

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n$$

時才成立。

三 几个有趣的应用

看来似乎数学味道很浓的定理一却有不少我們意想不到的应用。

(一)如果你仔細留心一下食品店里出售的罐头食品,你会发现这些罐头的形状大部分是高和底面直径大致相等的圆柱形。除非有特殊的原因,很难发现有细得象根棍子,或者扁得象个月饼的罐头。你有没有想过这是为什么?当然,高和底面直径大致相等的圆柱形看上去比较匀称,这应该是一条理由。但更重要的原因似乎还不在这里,而应该从我們的定理一中得到答案。

我們知道,为了存放一定量的食品,罐头的容积往往是一样的,不妨設它是 V_0 。但是容积是 V_0 的圆柱形罐头可以有各式各样的形状,它可以很长很细,也可以是很扁的。在这各式各样的罐头中尽管容积都是一样的,但是它們的表面积却随着形状而改变。也就是说,在同样可以存放容积是 V_0 的食品的許多罐头中,有的罐头用料較省,而有的罐头却比較費料。显然,从节约的观点来看,我們当然應該制造用料最省的那种罐头。那么究竟怎么样的罐头用料最省呢?

如图 2,設罐头的高是 h ,底半径是 r ,由于它的容积是 V_0 ,所以有

$$\pi r^2 h = V_0.$$

其次,我們知道它的表面积 S 等于上



图 2.

下两个底面积的和 $2\pi r^2$ 加上侧面积 $2\pi r h$, 即

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$$

我們的問題就是要适当地选择 r, h , 使 S 有最小值. 根据定理一, 我們有

$$\begin{aligned} S &= 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \pi r h + \pi r h \\ &\geq 3\sqrt[3]{(2\pi r^2)(\pi r h)(\pi r h)} = 3\sqrt[3]{2\pi(\pi r^2 h)^2} \\ &= 3\sqrt[3]{2\pi V_0^2} = \text{常数}. \end{aligned}$$

这个不等式告訴我們, 表面积永远不会比

$$3\sqrt[3]{2\pi V_0^2}$$

小, 因此如果能找到适当的 r, h , 使 S 的值就等于 $3\sqrt[3]{2\pi V_0^2}$, 那么这个 r, h 就是我們要找的了. 要找出这样的 r, h 并不困难, 只要把上面不等式中的不等号变成等号就行了. 刚才講过, 等号成立的条件是所有的数彼此相等, 在我們的問題中便有:

$$2\pi r^2 = \pi r h = \pi r h,$$

由此立刻得出: $h = 2r$,

即高和底面的直径應該相等. 这就是我們所要的結論.

当 $h = 2r$ 时, 由

$$\pi r^2 h = 2\pi r^3 = V_0,$$

可得 $r = \sqrt[3]{\frac{V_0}{2\pi}}$, $h = \sqrt[3]{\frac{4V_0}{\pi}}$.

根据这两个式子就可从 V_0 定出 r 和 h 的具体数值.

(二) 在一张半径是 R 的圓桌的正中央上空挂一盞电灯. 大家知道, 灯挂得太高了, 桌子边缘的亮度就小; 但若挂得很低, 桌子边缘处仍然是不亮的. 那么究竟應該怎样选择灯的

高度，才能使桌子边缘处最亮？

我們还是用定理一来解决这問題。

如图 3，設桌子的半径是 R ，灯的高度是 h ，从灯射到桌子边缘的光綫和桌面成 θ 角。从物理学知道，桌子边缘一点处的照度 I 和 θ 的正弦成正比，而和这一点到光源的距离 r 的平方成反比，也就是说

$$I = k \frac{\sin \theta}{r^2},$$




图 3.

这里 k 是一个和灯光强度有关的常数。从图上容易看出

$$r = \frac{R}{\cos \theta},$$

因此上式又可写为

$$I = \frac{k}{R^2} \sin \theta \cos^2 \theta,$$

我們的問題就是要选择适当的 θ ，使 I 有最大值。容易知道，使 I^2 取最大值的 θ 值也一定使 I 取最大值。因此只須求出使

$$I^2 = \frac{k^2}{R^4} \sin^2 \theta \cos^4 \theta$$

取最大值的 θ 就行了。根据定理一，我們有：

$$\begin{aligned} I^2 &= \frac{k^2}{R^4} \sin^2 \theta \cos^4 \theta \\ &= \frac{k^2}{2R^4} (2\sin^2 \theta) (\cos^2 \theta) (\cos^2 \theta) \\ &\leq \frac{k^2}{2R^4} \left(\frac{2\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + \cos^2 \theta}{3} \right)^3 \\ &= \frac{4k^2}{27R^4} = \text{常数.} \end{aligned}$$

所以 I^2 永远不会超过 $\frac{4k^2}{27R^4}$. 因此要使 I^2 最大，只須使上面不等式中的等号成立就行了。所以有：

$$2\sin^2 \theta = \cos^2 \theta = \cos^2 \theta,$$

由此可得 $\operatorname{tg}^2 \theta = \frac{1}{2}$, 或 $\operatorname{tg} \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$,

因而 $h = R \operatorname{tg} \theta = \frac{R}{\sqrt{2}}$.

这就是說，如果把灯挂在离桌面 $\frac{R}{\sqrt{2}}$ 处，桌子边缘的亮度最大。这个結果对你晚上看書是有現實意義的。

(三)由半径是 R 的圓上割去一个扇形，把剩下的部分围成一个圓錐。显然，这个圓錐的体积和割去的扇形的大小有




图 4.

关。割的太多了，圓錐的体积就小，割的太少了，圓錐的体积还是小。請問，究竟應該割去多大一块，才能使所围成的圓錐有最大的体积？

如图 4，命 x 表示剪剩下来的角度。由于圓錐是由剪剩下来的部分围成的，因此圓錐底圓的周长就等于剪剩那部分的周长，即

$$2\pi r = xR,$$

或

$$r = \frac{Rx}{2\pi}.$$

圓錐的母綫長就是这个圓的半径 R ，所以圓錐的高

$$h = \sqrt{R^2 - r^2} = \frac{R}{2\pi} \sqrt{4\pi^2 - x^2}.$$

所以圓錐的體積

$$\begin{aligned}V &= \frac{1}{3} h \pi r^2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{R}{2\pi} \sqrt{4\pi^2 - x^2} \pi \left(\frac{Rx}{2\pi}\right)^2 \\&= \frac{R^3}{24\pi^2} x^2 \sqrt{4\pi^2 - x^2},\end{aligned}$$

現在的問題就是要适当选取 x 值，使體積 V 有最大值。和上題一样的想法，只要找出使 V^2 有最大值的 x 就行了。由定理一得：

$$\begin{aligned}V^2 &= \frac{R^6}{576\pi^4} x^4 (4\pi^2 - x^2) = \frac{R^6}{1152\pi^4} x^2 \cdot x^2 (8\pi^2 - 2x^2) \\&\leq \frac{R^6}{1152\pi^4} \left[\frac{x^2 + x^2 + (8\pi^2 - 2x^2)}{3} \right]^3 \\&= \frac{4}{243} \pi^2 R^6 = \text{常数},\end{aligned}$$

也就是說 V^2 永遠不超过 $\frac{4}{243} \pi^2 R^6$ 。要使它有最大值，只要上述不等式中的等号成立，所以有：

$$x^2 = x^2 = 8\pi^2 - 2x^2,$$

由此立得 $x = 2\pi \sqrt{\frac{2}{3}}$.

所以剪去的扇形的中心角應該是

$$2\pi - 2\pi \sqrt{\frac{2}{3}} = 2\pi \left(1 - \sqrt{\frac{2}{3}}\right) \text{ 弧度}.$$

上面三個例題都是要求在一定的條件下去尋找某個量的最大值或最小值。這一大類問題統稱為極大極小問題。微分學給出了解極大極小問題的一般方法。而在我們這兒反復運用定理一就可解決它們了。不過有時光用定理一似乎還嫌不夠，還需另外想點辦法。讓我們再來看一個例子：

(四)設有一張長 80 厘米、寬 50 厘米的長方形紙片，從它的四角各剪去一個邊長是 x 的小正方形之後，可以把余下的部分做成一個沒有蓋的點心盒。請問 x 應該是多長，才能使點心盒的容積最大？




圖 5.

從圖 5 很容易看出，剪去四角後所得盒子的容積是

$$V = x(80 - 2x)(50 - 2x).$$

為了在不等式中消去變數 x ，使不等式的右端只出現常數，我們把 V 寫成

$$V = \frac{1}{4} \cdot 4x(80 - 2x)(50 - 2x),$$

把 $4x, 80 - 2x, 50 - 2x$ 看成三個數來應用定理一，得：

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{4} \cdot 4x(80 - 2x)(50 - 2x) \\ &\leq \frac{1}{4} \left(\frac{4x + (80 - 2x) + (50 - 2x)}{3} \right)^3 \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{130}{3} \right)^3 = \text{常數}. \end{aligned}$$

為要使 V 有最大值，只須上述不等式中的等號成立，因此有：

$$4x = 80 - 2x = 50 - 2x,$$

但顯然這是一個矛盾的方程式，由它無法解出 x 值。為此我們得另想他法。我們不妨引入一個待定的常數 k ，把 V 寫成

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{1}{k(2k+2)} [(2k+2)x][80-2x][50k-2kx] \\
 &\leq \frac{1}{k(2k+2)} \left[\frac{(2k+2)x + (80-2x) + (50k-2kx)}{3} \right]^3 \\
 &= \frac{1}{k(2k+2)} \left(\frac{80+50k}{3} \right)^3 = \text{常数.}
 \end{aligned}$$

因此当 $(2k+2)x = 80 - 2x = 50k - 2kx$
时, V 有最大值. 这样我們便得到了 x 所滿足的两个方程式:

$$(2k+2)x = 80 - 2x,$$

$$(2k+2)x = 50k - 2kx.$$

这两个方程式分別有解:

$$x = \frac{40}{k+2}, \quad x = \frac{25k}{2k+1}.$$

要使这問題有解, 这两个 x 的值当然應該相等. 为此只須选取 k 的值, 使它滿足:

$$\frac{40}{k+2} = \frac{25k}{2k+1},$$

从这个方程式解得

$$k = 2, \text{ 或 } k = -\frac{4}{5}.$$

显然, k 不能取負值, 不然的話
 V 中第三个因子將取負值. 因
此必須取 $k = 2$, 代入上式即得
 $x = 10$, 这就是問題的答案.

(五) 最后我們講一个有趣的
几何問題: 在周長是 $2l$ 的四
邊形中, 以怎样的四邊形面積




图 6.

最大?

这个问题一下子是不容易回答的,但利用定理一却可以使问题得到解答。当然,这里还需要一些数学技巧。

如图 6,以 A 記四邊形的面積, a, b, c, d 記它的各邊的長。由題意得:

$$a+b+c+d=2l,$$

从图 6 显然可知:

$$2A=ab \sin\phi + cd \sin\psi.$$

所以

$$4A^2=a^2b^2\sin^2\phi+c^2d^2\sin^2\psi+2abcd\sin\phi\sin\psi. \quad (1)$$

利用余弦定理計算對角線 AC 的長度,即有

$$a^2+b^2-2ab\cos\phi=c^2+d^2-2cd\cos\psi,$$

或者 $(a^2+b^2-c^2-d^2)^2$

$$=4a^2b^2\cos^2\phi+4c^2d^2\cos^2\psi-8abcd\cos\phi\cos\psi. \quad (2)$$

為了消去 ϕ 和 ψ ,用 4 乘(1)然后和(2)相加,并記

$$\phi+\psi=\theta,$$

得

$$\begin{aligned} 16A^2+(a^2+b^2-c^2-d^2)^2 &= 4a^2b^2+4c^2d^2-8abcd\cos\theta \\ &= 4(ab+cd)^2-16abcd\cos^2\frac{\theta}{2}, \end{aligned}$$

或者

$$\begin{aligned} A^2 &= \frac{1}{16}[4(ab+cd)^2-(a^2+b^2-c^2-d^2)^2]-abcd\cos^2\frac{\theta}{2} \\ &= \frac{1}{16}[2(ab+cd)+(a^2+b^2-c^2-d^2)][2(ab+cd) \\ &\quad -(a^2+b^2-c^2-d^2)]-abcd\cos^2\frac{\theta}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{16} [(a+b)^2 - (c-d)^2] [(c+d)^2 - (a-b)^2] \\
&\quad - abcd \cos^2 \frac{\theta}{2} \\
&= \frac{1}{16} (a+b+c+d)(a+b+c-d)(c+d-a+b)(c+d \\
&\quad + a-b) - abcd \cos^2 \frac{\theta}{2} \\
&= \frac{1}{16} (2l-2c)(2l-2d)(2l-2a)(2l-2b) - abcd \cos^2 \frac{\theta}{2} \\
&= (l-a)(l-b)(l-c)(l-d) - abcd \cos^2 \frac{\theta}{2}.
\end{aligned}$$

由于 $ab \cos^2 \frac{\theta}{2} \geq 0$, (3)

所以有 $A^2 \leq (l-a)(l-b)(l-c)(l-d)$.

再用定理一, 即得

$$\begin{aligned}
A^2 &\leq (l-a)(l-b)(l-c)(l-d) \\
&\leq \left[\frac{(l-a)+(l-b)+(l-c)+(l-d)}{4} \right]^4 \\
&= \left(\frac{l}{2} \right)^4 = \text{常数}.
\end{aligned} \tag{4}$$

这就是說, 四邊形的面積永遠不超過 $(\frac{l}{2})^2$. 為了使 A 有最大值, 只須 (3)、(4) 中的等號都成立. 要 (3) 中的等號成立, 只須

$$\theta = \pi, \tag{5}$$

要 (4) 中的等號成立, 只須

$$l-a = l-b = l-c = l-d,$$

即 $a=b=c=d$. (6)

綜合條件 (5)、(6), 即知這四邊形是一個正方形. 于是我們



得到这样的結論：在周長一定的四邊形中，以正方形的面積為最大。我們還可得到和這等價的結論：在所有面積相同的四邊形中，以正方形的周長為最短。

习 题

1. 設 x_1, x_2, \dots, x_n 都是正數，證明：

(i) 如果 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = c$ ，那麼當 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = \frac{c}{n}$ 時，乘積 $x_1 x_2 \dots x_n$ 有最大值 $\left(\frac{c}{n}\right)^n$ ；

(ii) 如果 $x_1 x_2 \dots x_n = c$ ，那麼當 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = \sqrt[n]{c}$ 時，和式 $x_1 + x_2 + \dots + x_n$ 有最小值 $n\sqrt[n]{c}$ 。

注意 上面所舉的幾個應用題實際上所根據的就是這兩條性質。

2. 把一長為 l 的鐵絲彎成一個矩形，問怎樣彎法，才能使它有最大面積？

3. 証明圓內接矩形以正方形面積為最大。

4. 把 16 分成四個正數之和，問怎樣分法，才能使這四個數的乘積有最大值？

5. 某工廠要製造一個無蓋的圓柱形桶，它的容積是 $\frac{3}{2}\pi$ 立方米。用來做底的金屬每平方米 3 元，做側面的金屬每平方米 2 元，問怎樣造這圓桶，才能使成本最低？

6. 問 θ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$) 取什麼值時，函數

$$y = \sin^2 \theta \cos \theta$$

取最大值？

7. 用籬笆圍成面積是 100 平方米的矩形菜園，問籬笆至少需要多少長？

8. 試証容積一定的圓錐形帳幕只有當它的高是底半徑的 $\sqrt{2}$ 倍時，所需材料最省。

四 几个简单的不等式

不等式在高等数学中占有相当重要的地位。事实上，我們的定理一就是一个十分重要的不等式。刚才我們已經看到了它在解极值問題上所起的作用。这一节，我們將从定理一出发，推出另一些有用的不等式。

推論一 如果 n 个正数的乘积等于 1，那么它们的和一定不小于 n 。即从

$$a_1 a_2 \cdots a_n = 1,$$

可以推出 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq n$,

而且等号只有当

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 1$$

时才能成立。

証明十分简单。因为在題設的条件下，这 n 个正数的几何平均

$$G = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = 1,$$

所以从定理一即得

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n \geq n.$$

等号成立的条件是显然的。

推論二 对任意 n 个正数 a_1, a_2, \dots, a_n ，恒有

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right) \geq n^2.$$

証明也很简单，只要利用不等式 $H \leq A$ ，即得：

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n},$$

由此即得

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right) \geq n^2.$$

下面我們舉幾個例子來說明這些不等式的用處。

例 1 設 a_1, a_2, \dots, a_n 是任意 n 個正數，試証：

$$a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n \geq n a_1 a_2 \cdots a_n.$$

証 由定理一得：

$$a_1 a_2 \cdots a_n = \sqrt[n]{a_1^n a_2^n \cdots a_n^n} \leq \frac{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n}{n},$$

兩端同乘以 n ，即得所要証的不等式。

在上面這個不等式中分別取 $n=2, 3, 4, \dots$ 可得：

$$a_1^2 + a_2^2 \geq 2 a_1 a_2,$$

$$a_1^3 + a_2^3 + a_3^3 \geq 3 a_1 a_2 a_3,$$

$$a_1^4 + a_2^4 + a_3^4 + a_4^4 \geq 4 a_1 a_2 a_3 a_4,$$

.....

例 2 設 $a, b, c > 1$ ，試証：

$$\log_a b + \log_b c + \log_c a \geq 3.$$

証 由對數的性質，不難証明：

$$(\log_a b)(\log_b c)(\log_c a) = 1.$$

所以由推論一立得所要証明的結果。

例 3 設 a, b, c, d 都是正數，試証：

$$\frac{1}{a+b+c} + \frac{1}{b+c+d} + \frac{1}{c+d+a} + \frac{1}{a+b+d} \geq \frac{16}{3} \frac{1}{a+b+c+d}.$$

証 命 $a_1 = a+b+c, a_2 = b+c+d,$

$a_3 = c+d+a, a_4 = a+b+d,$

于是

$$\begin{aligned} a_1 + a_2 + a_3 + a_4 \\ = (a+b+c) + (b+c+d) + (c+d+a) + (a+b+d) \\ = 3(a+b+c+d). \end{aligned} \quad (1)$$

由推論二得：

$$(a_1 + a_2 + a_3 + a_4) \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \frac{1}{a_4} \right) \geq 16. \quad (2)$$

(1)代入(2), 得：

$$\begin{aligned} 3(a+b+c+d) \\ \times \left(\frac{1}{a+b+c} + \frac{1}{b+c+d} + \frac{1}{c+d+a} + \frac{1}{a+b+d} \right) \geq 16, \end{aligned}$$

两端同乘以 $\frac{1}{3(a+b+c+d)}$, 即得所要証明的結果.

例 4 設 a, b 是两任意不相等的正数, 試証:

$$ab^n < \left(\frac{a+nb}{n+1} \right)^{n+1}.$$

証 据定理一,

$$\sqrt[n+1]{ab^n} = \sqrt[n+1]{\underbrace{abbb\dots b}_{n个}} < \frac{\overbrace{a+b+\dots+b}^{n个}}{n+1} = \frac{a+nb}{n+1}.$$

两边同乘 $n+1$ 次方, 即得所要証的不等式.

例 5 試証 $x_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ 和 $y_n = (1 - \frac{1}{n})^n$ 都是递增数列, 而 $z_n = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$ 是递减数列.

証: 先証 x_n 和 y_n 是递增的. 即要証:

$$x_n < x_{n+1}, \quad y_n < y_{n+1}.$$

由例 4 的結果可得：

$$\begin{aligned}x_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left[\frac{1+n(1+\frac{1}{n})}{n+1}\right]^{n+1} \\&= \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = x_{n+1},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_n &= \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n < \left[\frac{1+n(1-\frac{1}{n})}{n+1}\right]^{n+1} \\&= \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = y_{n+1}.\end{aligned}$$

再証 z_n 是遞減的，即要証：

$$\begin{aligned}z_n &> z_{n+1}, \\z_n &= \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} = \frac{1}{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}} \\&= \frac{1}{\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}} = \frac{1}{y_{n+1}},\end{aligned}$$

同理：

$$z_{n+1} = \frac{1}{y_{n+2}}.$$

但因 y_n 是遞增的，所以 $y_{n+1} < y_{n+2}$ ，因而

$$\frac{1}{y_{n+1}} > \frac{1}{y_{n+2}},$$

所以得

$$z_n > z_{n+1}.$$

關於數列 x_n ，還可以進一步探討一下：這個數列既然隨着 n 的增大而增大，它是否可能趨于無窮大呢？由於

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = z_n,$$

而 z_n 是递减的, 所以

$$z_n < z_1 = 4,$$

因而得

$$x_n < 4.$$

这就是說, 一方面, 数列 x_n 是递增的; 另一方面它永远不会超过 4, 因而 x_n 是一个递增而有界的数列。根据数列极限的定理, 知道 x_n 一定有极限。我們用 e 来記这个极限值, 即

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

数 e 在高等数学中十分重要。我們知道, 中学里的对数是用 10 作底的, 叫做常用对数。高等数学中的对数一般不用 10 作底, 而用数 e 作底, 叫做自然对数。用 e 作底时, N 的对数記作

$$\log_e N \text{ 或者 } \ln N.$$

数 e 和圆周率 π 一样, 不仅是无理数, 而且还是超越数, 即它們都不是整系数的代数方程式的根。

利用电子計算机, 人們已把这两个数算到准确到小数点后好几百位。数 e 的小数点后 15 位的值是:

$$e = 2.718281828459045\cdots$$

作为这一节的結尾, 我們再介紹一个以后要用到的不等式。

定理二 設 $x > -1$, 那么

(一) 当 $0 < \alpha < 1$ 时有

$$(1+x)^\alpha \leqslant 1 + \alpha x,$$

(二) 当 $\alpha < 0$ 或 $\alpha > 1$ 时有

$$(1+x)^\alpha \geq 1 + \alpha x.$$

上两式中的等号当并且只当 $x=0$ 时成立。

證明 先証定理的前半部。

設 α 是一有理数，所以可表成为分數： $\alpha = \frac{m}{n}$ ，因 $0 < \alpha < 1$ ，所以 m, n 都是正整数，而且 $m < n$ 。由假定 $x > -1$ ，知 $1+x > 0$ ，所以由定理一得：

$$\begin{aligned} (1+x)^\alpha &= (1+x)^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{(1+x)^m} \\ &= \sqrt[n]{\underbrace{(1+x)\cdots(1+x)}_{m \text{ 个}} \cdot \underbrace{1 \cdot 1 \cdots 1}_{n-m \text{ 个}}} \leq \frac{m(1+x) + (n-m)}{n} \\ &= \frac{mx+n}{n} = 1 + \frac{m}{n}x = 1 + \alpha x, \end{aligned}$$

其中等号当并且只当 $1+x=1$ 即 $x=0$ 时才成立。

上面就 α 是有理数的情形証明了定理的前半部。今設 α 是任何小于 1 的正实数，这时一定能得一有理数列 $r_1, r_2, \dots, r_n, \dots$ 无限接近 α ，且 $0 < r_n < 1$ ，即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \alpha.$$

由于 r_n 都是有理数，所以当 $x > -1$ 时，下列不等式都成立：

$$(1+x)^{r_n} \leq 1 + r_n x \quad (n=1, 2, \dots).$$

于是

$$(1+x)^\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} (1+x)^{r_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + r_n x) = 1 + \alpha x.$$

这样就完全証明了(一)。

現在再来証明定理的后半部。

先设 $\alpha > 1$. 若 $1 + \alpha x < 0$, 那么由于 $(1+x)^{\alpha} > 0$; 因此不等式

$$(1+x)^{\alpha} \geq 1 + \alpha x$$

显然成立. 所以不妨设 $1 + \alpha x \geq 0$. 由于 $\alpha > 1$, 所以

$$0 < \frac{1}{\alpha} < 1, \text{ 用(一)中的结论得:}$$

$$(1 + \alpha x)^{\frac{1}{\alpha}} \leq 1 + \frac{1}{\alpha} \cdot \alpha x = 1 + x,$$

两边同乘 α 次方, 即得:

$$(1+x)^{\alpha} \geq 1 + \alpha x.$$

最后证明 $\alpha < 0$ 的情形. 我们还是设法利用(一)的结果. 因为 $\alpha < 0$, 所以 $-\alpha > 0$. 取自然数 n , 使得

$$n > \max(-\alpha, |\alpha x|).$$

于是

$$0 < \frac{-\alpha}{n} < 1,$$

$$\frac{|\alpha x|}{n} < 1, \quad \text{或者} \quad -1 < \frac{\alpha x}{n} < 1.$$

因而有

$$1 - \frac{\alpha x}{n} > 0, \quad 1 + \frac{\alpha x}{n} > 0.$$

应用已证得的(一), 有

$$(1+x)^{-\frac{\alpha}{n}} \leq 1 + \left(\frac{-\alpha}{n}\right)x = 1 - \frac{\alpha}{n}x,$$

或

$$(1+x)^{\frac{\alpha}{n}} \geq \frac{1}{1 - \frac{\alpha}{n}x} \geq 1 + \frac{\alpha}{n}x. \quad (3)$$

$$\text{这是因为 } \left(1 - \frac{\alpha}{n}x\right)\left(1 + \frac{\alpha}{n}x\right) = 1 - \left(\frac{\alpha x}{n}\right)^2 \leq 1.$$

(3)式两边同乘 n 次方，并利用刚才证得的结果，得：

$$(1+x)^n \geq \left(1+\frac{\alpha}{n}x\right)^n \geq 1+n \cdot \frac{\alpha}{n}x = 1+\alpha x.$$

定理二到这里全部证完。

习 题

1. 设 $x \geq 0$, 试证:

$$1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{2n} \geq (2n+1)x^n.$$

2. 证明：当 $n > 1$ 时 $n! < \left(\frac{n+1}{2}\right)^n$, 其中 $n! = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1$.

3. 设 a, b, c 都是正数, 试证:

$$(a+b+c)(a^2+b^2+c^2) \geq 9abc.$$

4. 设 a_1, a_2, \dots, a_n 是任意 n 个正数, 试证不等式

$$\frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_n}{a_1} \geq n.$$

5. 试证不等式 $\frac{x^2+5}{\sqrt{x^2+4}} > 2$.

6. 设 x, y, z 都是正数, 试证不等式

$$x^4+y^4+z^4 \geq x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2 \geq xyz(x+y+z).$$

7. 设 a, b, c 都是正数, 而且满足 $a+b+c=1$, 试证:

$$\left(\frac{1}{a}-1\right)\left(\frac{1}{b}-1\right)\left(\frac{1}{c}-1\right) \geq 8.$$

8. 设 $a_1, a_2, a_3; b_1, b_2, b_3$ 都是正数, 试证:

$$\left(\frac{a_1}{b_1}+\frac{a_2}{b_2}+\frac{a_3}{b_3}\right)\left(\frac{b_1}{a_1}+\frac{b_2}{a_2}+\frac{b_3}{a_3}\right) \geq 9.$$

9. 设 a_1, a_2, \dots, a_n 都是正数, 命 $S=a_1+a_2+\cdots+a_n$, 试证:

$$\frac{S}{S-a_1} + \frac{S}{S-a_2} + \cdots + \frac{S}{S-a_n} \geq \frac{n^2}{n-1}.$$

10. 設 a, b, c 是任意三個正數，試証

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} > \frac{3}{2}.$$

11. 設 a_1, a_2, \dots, a_n 都是正數，命 $S = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ ，試証：

$$(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n) \leq 1+S+\frac{S^2}{2!}+\frac{S^3}{3!}+\cdots+\frac{S^n}{n!}.$$

五 幕 平 均

在引言中我們就提到，可以有各种各样的方式來定义一組數的平均值。前面我們給出了三种平均——算术平均、几何平均和調和平均，并研究了这三者之間的关系，得出了一个很重要的結果：

$$H \leq G \leq A.$$

在这一节，我們要進一步拓廣平均的概念。

設 a_1, a_2, \dots, a_n

是任意 n 個正數，我們稱

$$M_\gamma(a_1, a_2, \dots, a_n) = \left(\frac{a_1^\gamma + a_2^\gamma + \cdots + a_n^\gamma}{n} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \quad (\gamma \neq 0)$$

为這一組數的 γ 次幕平均。以后簡記為 $M_\gamma(a)$ 。

显然， $M_\gamma(a)$ 具有前面所提到的关于 H, G, A 所共有的两条基本性質，即：

(一) 若 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = C$ ，那么 $M_\gamma(a) = C$ ；

(二) 若 $m \leq a_i \leq M$ ($i = 1, 2, \dots, n$)，那么 $m \leq M_\gamma(a) \leq M$ 。

从 $M_\gamma(a)$ 的定义式子显然可以看出 $M_0(a)$ 是沒有意義的。但是我們可以研究当 $\gamma \rightarrow 0$ 时 $M_\gamma(a)$ 的极限。下面我們

将證明, $\lim_{\gamma \rightarrow 0} M_\gamma(a)$ 是存在的, 而且恰好是这 n 个数的几何平均, 即 $\lim_{\gamma \rightarrow 0} M_\gamma(a) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = G$. (1)

为了證明这个結果, 必須先計算几个在高等数学中极为重要的极限.

引理一 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$.

証 先証 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$.

命 $[x] \text{①} = n$,

于是 $n \leq x < n+1$,

所以当 $x \rightarrow +\infty$ 时, n 也趋于 ∞ , 而且

$$1 + \frac{1}{n+1} \leq 1 + \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{n}$$

所以

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n &\leq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \\ &< \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}. \end{aligned} \quad (2)$$

由第四节例 5 知道

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e, \end{aligned}$$

① $[x]$ 表示实数 x 的整数部分, 即不超过 x 的最大整数. 如 $[2.8] = 2$, $[-1.3] = -2$.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}} \\ &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)} = e.\end{aligned}$$

这就是說不等式(2)的兩端,當 $x \rightarrow +\infty$ 即 $n \rightarrow +\infty$ 時,都以 e 為極限,所以夾在中間的 $(1 + \frac{1}{x})^x$ 當 $x \rightarrow +\infty$ 時也以 e 為

極限,即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$

當 $x \rightarrow -\infty$ 時,命 $x = -y$,那麼 $y \rightarrow +\infty$,這時

$$\begin{aligned}\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \left(1 - \frac{1}{y}\right)^{-y} = \left(\frac{y-1}{y}\right)^{-y} = \left(\frac{y}{y-1}\right)^y \\ &= \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^y = \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^{y-1} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right).\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^{y-1} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right) \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^{y-1} \cdot \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right) = e.\end{aligned}$$

綜合上面兩個結果,即得:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

如果命 $a = \frac{1}{x}$,那麼當 $x \rightarrow \infty$ 時, $a \rightarrow 0$. 于是上述極限又可寫為 $\lim_{a \rightarrow 0} (1+a)^{\frac{1}{a}} = e.$ (3)

引理二 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$

証 如果命 $y = (1+x)^{\frac{1}{x}},$ (4)

那么由(3)可知, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $y \rightarrow e.$ 在(4)两端取以 e 为底的自然对数, 得

$$\ln y = \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \frac{\ln(1+x)}{x}.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{y \rightarrow e} \ln y = \ln e = 1.$

引理三 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a.$

証 命 $y = a^x - 1,$ 那么当 $x \rightarrow 0$ 时, y 也趋于 0. 这时 $a^x = 1+y,$ 两边取自然对数得:

$$x \ln a = \ln(1+y),$$

即 $x = \frac{\ln(1+y)}{\ln a}.$

于是 $\frac{a^x - 1}{x} = \frac{y}{\frac{\ln(1+y)}{\ln a}} = \frac{\ln a}{\frac{\ln(1+y)}{y}}.$

由引理二即得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln a}{\frac{\ln(1+y)}{y}} = \ln a.$$

有了这三条引理, 关于幂平均极限的等式(1)就不难証明了. 由于

$$\ln M_\gamma(a) = \frac{1}{\gamma} \ln \frac{a_1^\gamma + a_2^\gamma + \cdots + a_n^\gamma}{n},$$

如果命 $x = \frac{a_1^\gamma + a_2^\gamma + \cdots + a_n^\gamma}{n} - 1$,

那么因为 $\lim_{\gamma \rightarrow 0} a_i^\gamma = 1 \quad (i=1, 2, \dots, n)$,

所以 $\lim_{\gamma \rightarrow 0} x = 0$,

于是 $\ln M_\gamma(a) = \frac{1}{\gamma} \ln(1+x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \cdot \frac{x}{\gamma}, \quad (5)$

由引理二知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$,

且由引理三知

$$\begin{aligned} \lim_{\gamma \rightarrow 0} \frac{x}{\gamma} &= \lim_{\gamma \rightarrow 0} \frac{\frac{a_1^\gamma + a_2^\gamma + \cdots + a_n^\gamma}{n} - 1}{\gamma} \\ &= \frac{1}{n} \lim_{\gamma \rightarrow 0} \frac{a_1^\gamma + a_2^\gamma + \cdots + a_n^\gamma - n}{\gamma} \\ &= \frac{1}{n} \lim_{\gamma \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^\gamma - 1}{\gamma} + \frac{a_2^\gamma - 1}{\gamma} + \cdots + \frac{a_n^\gamma - 1}{\gamma} \right) \\ &= \frac{1}{n} \left(\lim_{\gamma \rightarrow 0} \frac{a_1^\gamma - 1}{\gamma} + \cdots + \lim_{\gamma \rightarrow 0} \frac{a_n^\gamma - 1}{\gamma} \right) \\ &= \frac{1}{n} (\ln a_1 + \ln a_2 + \cdots + \ln a_n) \\ &= \frac{1}{n} \ln(a_1 a_2 \cdots a_n) = \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \end{aligned}$$

在(5)两端取 $\gamma \rightarrow 0$ 的极限, 即得

$$\begin{aligned} \lim_{\gamma \rightarrow 0} \ln M_\gamma(a) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} \cdot \lim_{\gamma \rightarrow 0} \frac{x}{\gamma} \\ &= \ln \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}, \end{aligned}$$

所以 $\lim_{\gamma \rightarrow 0} M_\gamma(a) = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} = G$.

根据这个結果，我們便可規定 $M_0(a)$ 的意義了。很自然，我們定義

$$M_0(a) = G.$$

这样一来， $M_\gamma(a)$ 便對任何實數 γ 都有意義了。

當 $\gamma = 1$ 時，

$$M_1(a) = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n},$$

就給出了算術平均；當 $\gamma = -1$ 時，

$$M_{-1}(a) = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}},$$

就給出了調和平均。

由此可見， γ 次幕平均的概念把許多種不同的求平均的方法統一起來了。

科學家們是永遠关心事物間的內在联系的。人們自然想知道，對任意兩個實數 α, β ， α 次幕平均 $M_\alpha(a)$ 和 β 次幕平均 $M_\beta(a)$ 間有些什麼关系呢？我們希望從定理一得到些啟發。從一般的幕平均的角度來看，我們的定理一不過是

$$M_{-1}(a) \leq M_0(a) \leq M_1(a),$$

它指出了當 $\gamma = -1, 0$ 和 1 時三者之間的關係。這裡值得注意的是三個足标的順序和不等號的順序是一致的。聰明的讀者自然會想到，一般來說，如果 $\alpha < \beta$ ，是否有不等式

$$M_\alpha(a) \leq M_\beta(a)$$

呢？下面的定理回答了這個問題。

定理三 設 a_1, a_2, \dots, a_n 是任意 n 個正數，如果 $\alpha < \beta$ ，那麼一定有 $M_\alpha(a) \leq M_\beta(a)$ ，等號只有當 n 個數全相等時才能

成立。

證明 把 $M_\alpha(a)$ 和 $M_\beta(a)$ 簡記為 M_α 和 M_β , 我們要証明 $M_\alpha \leq M_\beta$, 即 $\frac{M_\beta}{M_\alpha} \geq 1$. 按照幕平均的定義, 我們可把 $\frac{M_\beta}{M_\alpha}$ 寫

$$\begin{aligned} \text{為: } \quad \frac{M_\beta}{M_\alpha} &= \frac{1}{M_\alpha} \left(\frac{a_1^\alpha + a_2^\alpha + \cdots + a_n^\alpha}{n} \right)^{\frac{1}{\alpha}} \\ &= \left[\frac{\left(\frac{a_1}{M_\alpha} \right)^\beta + \left(\frac{a_2}{M_\alpha} \right)^\beta + \cdots + \left(\frac{a_n}{M_\alpha} \right)^\beta}{n} \right]^{\frac{1}{\beta}}. \end{aligned}$$

從 a_1, a_2, \dots, a_n 造一組新數:

$$a'_1 = \frac{a_1}{M_\alpha}, a'_2 = \frac{a_2}{M_\alpha}, \dots, a'_n = \frac{a_n}{M_\alpha},$$

這一組新數的 α 次幕平均

$$\begin{aligned} M'^\alpha &= \left(\frac{a'_1^\alpha + a'_2^\alpha + \cdots + a'_n^\alpha}{n} \right)^{\frac{1}{\alpha}} \\ &= \left[\frac{\left(\frac{a_1}{M_\alpha} \right)^\alpha + \left(\frac{a_2}{M_\alpha} \right)^\alpha + \cdots + \left(\frac{a_n}{M_\alpha} \right)^\alpha}{n} \right]^{\frac{1}{\alpha}} \\ &= \frac{1}{M_\alpha} \left(\frac{a_1^\alpha + a_2^\alpha + \cdots + a_n^\alpha}{n} \right)^{\frac{1}{\alpha}} = 1, \end{aligned}$$

它的 β 次幕平均

$$\begin{aligned} M'^\beta &= \left(\frac{a'^1_\beta + a'^2_\beta + \cdots + a'^n_\beta}{n} \right)^{\frac{1}{\beta}} \\ &= \left[\frac{\left(\frac{a_1}{M_\alpha} \right)^\beta + \left(\frac{a_2}{M_\alpha} \right)^\beta + \cdots + \left(\frac{a_n}{M_\alpha} \right)^\beta}{n} \right]^{\frac{1}{\beta}} = \frac{M_\beta}{M_\alpha}. \end{aligned}$$

因此只須証明 $M'^\beta \geq 1$ 就行了。也就是說, 只要對 α 次幕平均等於 1 的那組數來証明它的 β 次幕平均不小于 1 就可以

了。

因此，我們不妨一开始就假定 $M_\alpha = 1$ ，不然的話通過上面的討論可把問題化到這種情形。

由 $M_\alpha = 1$ 即 $\left(\frac{a_1^\alpha + a_2^\alpha + \dots + a_n^\alpha}{n} \right)^{\frac{1}{\alpha}} = 1$ 得：

$$a_1^\alpha + a_2^\alpha + \dots + a_n^\alpha = n, \quad (6)$$

我們的目的是要證明

$$a_1^\beta + a_2^\beta + \dots + a_n^\beta \geq n,$$

即 $(a_1^\alpha)^{\frac{\beta}{\alpha}} + (a_2^\alpha)^{\frac{\beta}{\alpha}} + \dots + (a_n^\alpha)^{\frac{\beta}{\alpha}} \geq n.$

命 $a_1^\alpha = 1 + b_1, \quad a_2^\alpha = 1 + b_2, \quad \dots, \quad a_n^\alpha = 1 + b_n,$

于是 $a_1^\alpha + a_2^\alpha + \dots + a_n^\alpha = n + b_1 + b_2 + \dots + b_n,$

由(6)即得 $b_1 + b_2 + \dots + b_n = 0. \quad (7)$

現在分三種情況來討論：

(i) 先假定 $\beta > \alpha > 0$ ，這時 $\frac{\beta}{\alpha} > 1$ ，所以由定理二的後半部得：

$$\left. \begin{aligned} (a_1^\alpha)^{\frac{\beta}{\alpha}} &= (1 + b_1)^{\frac{\beta}{\alpha}} \geq 1 + \frac{\beta}{\alpha} b_1, \\ (a_2^\alpha)^{\frac{\beta}{\alpha}} &= (1 + b_2)^{\frac{\beta}{\alpha}} \geq 1 + \frac{\beta}{\alpha} b_2, \\ &\cdots \cdots \cdots \cdots \\ (a_n^\alpha)^{\frac{\beta}{\alpha}} &= (1 + b_n)^{\frac{\beta}{\alpha}} \geq 1 + \frac{\beta}{\alpha} b_n. \end{aligned} \right\} \quad (8)$$

把這些不等式加起來，再應用(7)即得：

$$(a_1^\alpha)^{\frac{\beta}{\alpha}} + (a_2^\alpha)^{\frac{\beta}{\alpha}} + \dots + (a_n^\alpha)^{\frac{\beta}{\alpha}} \geq n. \quad (9)$$

即 $a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta \geq n,$

或者 $\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta}{n} \geq 1.$

两边乘 $\frac{1}{\beta}$ 次方，即得：

$$M_\beta \geq 1 = M_\alpha.$$

因此当 $\beta > \alpha > 0$ 时定理成立。

(ii) 若 $\alpha < \beta < 0$ ，那么 $0 < \frac{\beta}{\alpha} < 1$. 这时由定理二的前半部知不等式(8)的不等号全部要换方向，因此不等式(9)也要换方向，于是得：

$$a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta \leq n,$$

即 $\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta}{n} \leq 1.$

但因 $\beta < 0$ ，因此两边乘 $\frac{1}{\beta}$ 次方后，不等式要换方向，即

$$\left(\frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \cdots + a_n^\beta}{n} \right)^{\frac{1}{\beta}} \geq 1,$$

即 $M_\beta \geq 1 = M_\alpha.$

(iii) 最后讨论 α, β 异号的情形，即 $\alpha < 0 < \beta$ ，这时

$$\frac{\beta}{\alpha} < 0.$$

所以由定理二的后半部知不等式(8)这时全部成立，因而(9)也成立。于是完全和(i)一样，证得

$$M_\beta \geq M_\alpha.$$

这样，我们就 $\alpha < \beta$ 的各种情况证得了不等式

$$M_\alpha \leq M_\beta.$$

最后，我们来讨论等号成立的条件。要上式等号成立，必须

(8) 中的等号全部成立, 而由定理二知, 这只有在

$$b_1 = b_2 = \cdots = b_n = 0$$

时才有可能, 也就是說

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 1,$$

这是因为我們一开始假定了 $M_\alpha = 1$ 的緣故. 在一般的情况下, 等号成立的条件是:

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_n = M_\alpha.$$

定理三到这里全部証完.

特别, 由于 $-1 < 0 < 1 < 2$, 由定理三可得:

$$M_{-1} \leq M_0 \leq M_1 \leq M_2,$$

即調和平均不超过几何平均, 几何平均不超过算术平均, 而算术平均又不超过平方平均。

如果我們把 γ 次幂平均 $M_\gamma(a)$ 看作 γ 的函数, 那么定理三告訴我們, $M_\gamma(a)$ 是 γ 的递增函数, 也就是說, 隨着 γ 的增大, $M_\gamma(a)$ 的值越来越大. 那么当 $\gamma \rightarrow +\infty$ 时 $M_\gamma(a)$ 是否会趋于无穷大呢? 很容易知道这是不可能的. 因为若設 a_1, a_2 分別是 a_1, a_2, \dots, a_n 中最大的和最小的, 这時

$$a_2 \leq a_i \leq a_1 \quad (i=1, 2, \dots, n),$$

由此可以推出

$$a_2 \leq M_\gamma(a) \leq a_1.$$

因此 $M_\gamma(a)$ 是有界的, 它不能趋于 ∞ . 既然 $M_\gamma(a)$ 是 γ 的递增有界函数, 因此当 $\gamma \rightarrow +\infty$ 时它必有极限. 那么它的极限究竟是什么呢?

由于

$$M_\gamma(a) = \left(\frac{a_1^\gamma + a_2^\gamma + \cdots + a_n^\gamma}{n} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \geq \left(\frac{a_1^\gamma}{n} \right)^{\frac{1}{\gamma}} = a_1 \left(\frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{\gamma}},$$

所以得

$$a_1 \left(\frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{\gamma}} \leq M_\gamma(a) \leq a_1. \quad (10)$$

因为当 $\gamma \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{\gamma} \rightarrow 0$, 所以有 $\lim_{\gamma \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} \right)^{\frac{1}{\gamma}} = 1$, 因此当 $\gamma \rightarrow +\infty$ 时, 不等式(10)的左端以 a_1 为极限, 右端当然也以 a_1 为极限. 于是, 夹在中间的 $M_\gamma(a)$ 当然也只能以 a_1 为极限了, 即

$$\lim_{\gamma \rightarrow +\infty} M_\gamma(a) = a_1,$$

或者

$$\lim_{\gamma \rightarrow +\infty} M_\gamma(a) = \max(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

現在再研究 $\gamma \rightarrow -\infty$ 时 $M_\gamma(a)$ 的极限. 因为

$$\begin{aligned} M_{-\gamma}(a) &= \left(\frac{a_1^{-\gamma} + a_2^{-\gamma} + \cdots + a_n^{-\gamma}}{n} \right)^{-\frac{1}{\gamma}} \\ &= \left[\frac{\left(\frac{1}{a_1} \right)^\gamma + \left(\frac{1}{a_2} \right)^\gamma + \cdots + \left(\frac{1}{a_n} \right)^\gamma}{n} \right]^{-\frac{1}{\gamma}} \\ &= \frac{1}{\left[\frac{\left(\frac{1}{a_1} \right)^\gamma + \left(\frac{1}{a_2} \right)^\gamma + \cdots + \left(\frac{1}{a_n} \right)^\gamma}{n} \right]^{\frac{1}{\gamma}}} \\ &= \frac{1}{M_\gamma\left(\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \dots, \frac{1}{a_n}\right)} = \frac{1}{M_\gamma\left(\frac{1}{a}\right)}. \end{aligned}$$

根据刚才證明的結果

$$\lim_{\gamma \rightarrow -\infty} M_\gamma\left(\frac{1}{a}\right) = \max\left(\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \dots, \frac{1}{a_n}\right) = \min(a_1, a_2, \dots, a_n),$$

于是得

$$\begin{aligned}\lim_{\gamma \rightarrow -\infty} M_\gamma(a) &= \lim_{\gamma \rightarrow +\infty} M_{-\gamma}(a) = \frac{1}{\lim_{\gamma \rightarrow +\infty} M_\gamma\left(\frac{1}{a}\right)} \\ &= \min(a_1, a_2, \dots, a_n).\end{aligned}$$

这样，我們就弄清楚了當 $\gamma \rightarrow +\infty$ 和 $\gamma \rightarrow -\infty$ 時， $M_\gamma(a)$ 的變化情況，它們分別以

$$\max(a_1, a_2, \dots, a_n) \text{ 和 } \min(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

為極限，即

$$\lim_{\gamma \rightarrow +\infty} M_\gamma(a) = \max(a_1, a_2, \dots, a_n),$$

$$\lim_{\gamma \rightarrow -\infty} M_\gamma(a) = \min(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

习 题

1. 設 x, y, z 都是正數，且 $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ ，試証

$$x^3 + y^3 + z^3 \geq 16\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

2. 設 x, y, z 都是正數，且 $x^4 + y^4 + z^4 = 1$ ，試証

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq \sqrt{3}.$$

3. 設 x, y, z 都是正數，且 $x + y + z = 3$ ，試証

$$x^3 + y^3 + z^3 \geq 3.$$

4. 設 a_1, a_2, \dots, a_n 是任意 n 個正數，試証：

當 $\alpha \geq 1$ 時，有

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^\alpha \leq n^{\alpha-1} (a_1^\alpha + a_2^\alpha + \dots + a_n^\alpha),$$

當 $0 < \alpha \leq 1$ 時，有

$$(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^\alpha \geq n^{\alpha-1} (a_1^\alpha + a_2^\alpha + \dots + a_n^\alpha).$$

5. 設 a, b, c, d 都是正數，試証：

$$(a^3 + b^3 + c^3 + d^3)^2 \leq 4(a^6 + b^6 + c^6 + d^6),$$

6. 設 $a_1, a_2, \dots, a_n; \alpha, \beta$ 都是正數，且 $\gamma = \alpha + \beta$ ，試証：

$$\frac{a_1^\gamma + a_2^\gamma + \dots + a_n^\gamma}{n} \geq \frac{a_1^\alpha + a_2^\alpha + \dots + a_n^\alpha}{n} \cdot \frac{a_1^\beta + a_2^\beta + \dots + a_n^\beta}{n}.$$

7. 設 a, b, c 都是正數，試証：

- (i) $3(a^2 + b^2 + c^2) \geq (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2)$ ；
(ii) $a^6 + b^6 + c^6 \geq abc(a^2 + b^2 + c^2)$.

8. 設 x, y, z 都是正數，且 $xyz=1$ ，試証當 $n \geq 3$ 時，有

$$x^n + y^n + z^n \geq x^{n-3} + y^{n-3} + z^{n-3}.$$

9. 設 a, b 都是正數，而且 $a+b=1$ ，試証：

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 \geq \frac{25}{2}.$$

10. 設 a, b, c 都是正數，且 $a+b+c=1$ ，試証：

$$\left(a + \frac{1}{a}\right)^2 + \left(b + \frac{1}{b}\right)^2 + \left(c + \frac{1}{c}\right)^2 \geq \frac{100}{3}.$$

11. 設 a_1, a_2, \dots, a_n 都是正數，且 $a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1$ ，試証當 $m \geq 1$ 時，有

$$\left(a_1 + \frac{1}{a_1}\right)^m + \left(a_2 + \frac{1}{a_2}\right)^m + \dots + \left(a_n + \frac{1}{a_n}\right)^m \geq n \left(n + \frac{1}{n}\right)^m.$$

12. 設 x_1, x_2, \dots, x_n 是一組正數，且 滿足 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = c$ ，問 x_1, x_2, \dots, x_n 取什么值時，函數 $x_1^\alpha + x_2^\alpha + \dots + x_n^\alpha$ 取最小值？这儿 α 是大于 1 的定數。

六 加权平均

以上所講到的几种求平均的方法，有一个共同的特点，就是在求平均的过程中，我們对待各个原始数据是一視同仁的：既不特別看重 a_1 ，也不貶低 a_2 。这种求平均的方式有点硬性拉平的味道，在許多實際情況下是不合适的。

举个例子來說吧。如果某一家帽子工厂生产三种不同規格的帽子，它們的单价分別是3元，5元，10元，如果我們簡單地認為这家工厂产品的平均价格是

$$M = \frac{3\text{元} + 5\text{元} + 10\text{元}}{3} = 6\text{元},$$

那就不能反映实际情况。因为如果每种帽子的产量分别是：

3元	5元	10元
6000頂,	3000頂,	1000頂,

那么廉价帽的比重相对地大，高价帽的比重相对地小，求平均时必須把这一情况反映出来。但按照以前那种方法是做不到这一点的。比較合理的做法應該是：

$$\begin{aligned} M &= \frac{6000 \times 3 + 3000 \times 5 + 1000 \times 10}{6000 + 3000 + 1000} \\ &= \frac{6}{10} \times 3 + \frac{3}{10} \times 5 + \frac{1}{10} \times 10 = 4.3(\text{元}), \end{aligned}$$

这才是这家工厂所生产的帽子的平均价格。这里三个系数

$$p_1 = \frac{6}{10}, \quad p_2 = \frac{3}{10}, \quad p_3 = \frac{1}{10}$$

反映了各种产品在求平均过程中所起的作用。注意，这些系数还滿足关系：

$$p_1 + p_2 + p_3 = 1.$$

为了充分說明这种想法，讓我們再舉一个例子。如果有 n 种不同的溶液，它們的比重和体积如下：

	第一种	第二种	第n种
体 积	V_1	V_2	V_n
比 重	a_1	a_2	a_n

現在把这 n 种溶液混在一起，求这混合溶液的比重。显然，由于不同体积的溶液在整个混合液內所起的作用不同，因此混合溶液的比重并不是原有溶液比重的简单算术平均，而應該是：

$$a = \frac{V_1 a_1 + V_2 a_2 + \cdots + V_n a_n}{V_1 + V_2 + \cdots + V_n},$$

这里分子表示整个混合溶液的重量，分母表示混合溶液的体积。

如果命 $p_i = \frac{V_i}{V_1 + V_2 + \cdots + V_n}$ ($i = 1, 2, \dots, n$)，

那么有 $p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1$, $p_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

和上例一样，这儿的 p_i 反映了各种不同溶液在混合溶液內所起的作用。

从上面两个例子，使我們想到有必要引进另一种求平均值的方法。

如果有一組数 $p_i > 0$, 滿足条件

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1,$$

那么称数 $\bar{a} = p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n$ (1)

为數組 a_1, a_2, \dots, a_n 的加权平均。 p_i 称为加权系数。

加权平均也可定义为

$$\bar{a} = \frac{q_1 a_1 + q_2 a_2 + \cdots + q_n a_n}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n}, \quad (2)$$

其中 $q_i > 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。若命

$$p_i = \frac{q_i}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n} \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

这就回到了原来的定义。

算术平均是加权平均的一个特例, 相当于加权系数彼此相等, 即

$$p_1 = p_2 = \cdots = p_n = \frac{1}{n}$$

的情形. 显然加权平均也有算术平均所具有的两条基本性质. 例如当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = a$ 时, 加权平均

$$\bar{a} = p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n = a(p_1 + p_2 + \cdots + p_n) = a,$$

当 $m \leq a_i \leq M$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 时, 我们也有

$$\begin{aligned} m &= m(p_1 + p_2 + \cdots + p_n) \leq p_1 a_1 + p_2 a_2 + \cdots + p_n a_n \\ &\leq M(p_1 + p_2 + \cdots + p_n) = M, \end{aligned}$$

即 $m \leq \bar{a} \leq M$.

和以前一样, 我们还可引入加权幂平均作为加权平均概念的推广.

我们把

$$M_\gamma(a, p) = (p_1 a_1^\gamma + p_2 a_2^\gamma + \cdots + p_n a_n^\gamma)^{\frac{1}{\gamma}},$$

$$p_1 + p_2 + \cdots + p_n = 1, \quad p_i > 0;$$

$$\text{或者 } M_\gamma(a, q) = \left(\frac{q_1 a_1^\gamma + q_2 a_2^\gamma + \cdots + q_n a_n^\gamma}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n} \right)^{\frac{1}{\gamma}}, \quad q_i > 0$$

叫做 a_1, a_2, \dots, a_n 的加权幂平均. 当然它们也有算术平均所有的两条基本性质.

和以前一样, 这儿 $M_0(a, q)$ 是没有意义的, 我们必须补充它的定义. 为此我们研究当 $\gamma \rightarrow 0$ 时 $M_\gamma(a, q)$ 的极限. 注意

$$\ln M_\gamma(a, q) = \frac{1}{\gamma} \ln \frac{q_1 a_1^\gamma + q_2 a_2^\gamma + \cdots + q_n a_n^\gamma}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n}, \quad (3)$$

如果命 $x = \frac{q_1 a_1^\gamma + q_2 a_2^\gamma + \cdots + q_n a_n^\gamma}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n} - 1$,

那么当 $\gamma \rightarrow 0$ 时, x 也趋于 0. 現在(3)可寫为

$$\ln M\gamma(a, q) = \frac{1}{\gamma} \ln(1+x) = \frac{\ln(1+x)}{x} \cdot \frac{x}{\gamma},$$

和以前一样, 我們的主要工作是計算 $\lim_{\gamma \rightarrow 0} \frac{x}{\gamma}$. 因为

$$\begin{aligned} \frac{x}{\gamma} &= \frac{q_1 a_1^\gamma + q_2 a_2^\gamma + \cdots + q_n a_n^\gamma - (q_1 + q_2 + \cdots + q_n)}{\gamma(q_1 + q_2 + \cdots + q_n)} \\ &= \frac{1}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n} \left(q_1 \frac{a_1^\gamma - 1}{\gamma} + q_2 \frac{a_2^\gamma - 1}{\gamma} + \cdots + q_n \frac{a_n^\gamma - 1}{\gamma} \right) \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{\gamma \rightarrow 0} \frac{x}{\gamma} &= \frac{1}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n} \left(q_1 \lim_{\gamma \rightarrow 0} \frac{a_1^\gamma - 1}{\gamma} \right. \\ &\quad \left. + q_2 \lim_{\gamma \rightarrow 0} \frac{a_2^\gamma - 1}{\gamma} + \cdots + q_n \lim_{\gamma \rightarrow 0} \frac{a_n^\gamma - 1}{\gamma} \right) \\ &= \frac{1}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n} (q_1 \ln a_1 + q_2 \ln a_2 + \cdots + q_n \ln a_n) \\ &= \ln (a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n})^{\frac{1}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n}} \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned} \lim_{\gamma \rightarrow 0} \ln M\gamma(a, q) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} \cdot \lim_{\gamma \rightarrow 0} \frac{x}{\gamma} \\ &= \ln (a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n})^{\frac{1}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n}} \end{aligned}$$

即 $\lim_{\gamma \rightarrow 0} M\gamma(a, q) = (a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n})^{\frac{1}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n}}$ (4)

如果取 $q_1 = q_2 = \cdots = q_n = 1$, 这就是我們以前证得的結果.

根据这个結果, 我們很自然地規定

$$M_0(a, q) = (a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n})^{\frac{1}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n}}.$$

很自然会提出这样的問題：加权幂平均是否具有幂平均所有的性质？例如，如果 $\alpha < \beta$ ，是否一定有

$$M_\alpha(a, q) \leq M_\beta(a, q) ?$$

在定理三的基础上来回答这个問題并不困难。

定理四 如果 $\alpha < \beta$ ，那么必有 $M_\alpha(a, q) \leq M_\beta(a, q)$ ，其中等号只当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 时才成立。

证明 如果 q_1, q_2, \dots, q_n 都是自然数，那么这个結論很容易从定理三推出。因为这时

$$\begin{aligned} M_\alpha(a, q) &= \left(\frac{q_1 a_1^\alpha + q_2 a_2^\alpha + \cdots + q_n a_n^\alpha}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n} \right)^{\frac{1}{\alpha}} \\ &= \left(\frac{\underbrace{a_1^\alpha + \cdots + a_1^\alpha}_{q_1 \text{ 个}} + \underbrace{a_2^\alpha + \cdots + a_2^\alpha}_{q_2 \text{ 个}} + \cdots + \underbrace{a_n^\alpha + \cdots + a_n^\alpha}_{q_n \text{ 个}}}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n} \right)^{\frac{1}{\alpha}}, \end{aligned}$$

对 $\underbrace{a_1^\alpha, \dots, a_1^\alpha}_{q_1 \text{ 个}}, \underbrace{a_2^\alpha, \dots, a_2^\alpha}_{q_2 \text{ 个}}, \dots, \underbrace{a_n^\alpha, \dots, a_n^\alpha}_{q_n \text{ 个}}$ 这 $q_1 + q_2 + \cdots + q_n$ 个

数应用定理三，即得

$$\begin{aligned} M_\alpha(a, q) &= \left(\frac{\underbrace{a_1^\alpha + \cdots + a_1^\alpha}_{q_1 \text{ 个}} + \underbrace{a_2^\alpha + \cdots + a_2^\alpha}_{q_2 \text{ 个}} + \cdots + \underbrace{a_n^\alpha + \cdots + a_n^\alpha}_{q_n \text{ 个}}}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n} \right)^{\frac{1}{\alpha}} \\ &\leq \left(\frac{\underbrace{a_1^\beta + \cdots + a_1^\beta}_{q_1 \text{ 个}} + \underbrace{a_2^\beta + \cdots + a_2^\beta}_{q_2 \text{ 个}} + \cdots + \underbrace{a_n^\beta + \cdots + a_n^\beta}_{q_n \text{ 个}}}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n} \right)^{\frac{1}{\beta}} \\ &= \left(\frac{q_1 a_1^\beta + q_2 a_2^\beta + \cdots + q_n a_n^\beta}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n} \right)^{\frac{1}{\beta}} = M_\beta(a, q), \end{aligned}$$

因此,当 q_1, q_2, \dots, q_n 都是自然数时,定理成立。

今設 q_1, q_2, \dots, q_n 都是有理数,不妨設

$$q_i = \frac{s_i}{t_i} \quad (i=1, 2, \dots, n),$$

其中 s_i, t_i 都是自然数。这时

$$\begin{aligned} M_\alpha(a, q) &= \left(\frac{q_1 a_1^\alpha + \dots + q_n a_n^\alpha}{q_1 + q_2 + \dots + q_n} \right)^{\frac{1}{\alpha}} \\ &= \left(\frac{\frac{s_1}{t_1} a_1^\alpha + \frac{s_2}{t_2} a_2^\alpha + \dots + \frac{s_n}{t_n} a_n^\alpha}{\frac{s_1}{t_1} + \frac{s_2}{t_2} + \dots + \frac{s_n}{t_n}} \right)^{\frac{1}{\alpha}} \\ &= \left[\frac{(s_1 t_2 \dots t_n) a_1^\alpha + (t_1 s_2 t_3 \dots t_n) a_2^\alpha + \dots + (t_1 \dots t_{n-1} s_n) a_n^\alpha}{(s_1 t_2 \dots t_n) + (t_1 s_2 t_3 \dots t_n) + \dots + (t_1 \dots t_{n-1} s_n)} \right]^{\frac{1}{\alpha}}, \end{aligned}$$

由于

$$s_1 t_2 \dots t_n, t_1 s_2 t_3 \dots t_n, \dots, t_1 \dots t_{n-1} s_n$$

都是自然数,应用刚才証得的結果,即得:

$$\begin{aligned} M_\alpha(a, q) &\leq \left[\frac{(s_1 t_2 \dots t_n) a_1^\alpha + (t_1 s_2 t_3 \dots t_n) a_2^\alpha + \dots + (t_1 \dots t_{n-1} s_n) a_n^\alpha}{(s_1 t_2 \dots t_n) + (t_1 s_2 t_3 \dots t_n) + \dots + (t_1 \dots t_{n-1} s_n)} \right]^{\frac{1}{\beta}} \\ &= \left(\frac{\frac{s_1}{t_1} a_1^\beta + \frac{s_2}{t_2} a_2^\beta + \dots + \frac{s_n}{t_n} a_n^\beta}{\frac{s_1}{t_1} + \frac{s_2}{t_2} + \dots + \frac{s_n}{t_n}} \right)^{\frac{1}{\beta}} \\ &= \left(\frac{q_1 a_1^\beta + q_2 a_2^\beta + \dots + q_n a_n^\beta}{q_1 + q_2 + \dots + q_n} \right)^{\frac{1}{\beta}} = M_\beta(a, q), \end{aligned}$$

因此当 q_1, q_2, \dots, q_n 是有理数时定理依然正确。

最后設 q_1, q_2, \dots, q_n 是任意实數,这时我們一定可选取 n 个有理数列:

$$\{r_{\nu}^{(m)}\} \quad (m=1, 2, \dots, n),$$

使它們分別以 q_1, q_2, \dots, q_n 為極限，即

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} r_{\nu}^{(m)} = q_m \quad (m=1, 2, \dots, n).$$

對這些有理數來說，我們已經証得了：

$$M_{\alpha}(a, r_{\nu}) \leq M_{\beta}(a, r_{\nu}),$$

$$\text{即} \quad \left(\frac{r_{\nu}^{(1)}a_1^{\alpha} + r_{\nu}^{(2)}a_2^{\alpha} + \dots + r_{\nu}^{(n)}a_n^{\alpha}}{r_{\nu}^{(1)} + r_{\nu}^{(2)} + \dots + r_{\nu}^{(n)}} \right)^{\frac{1}{\alpha}}$$

$$\leq \left(\frac{r_{\nu}^{(1)}a_1^{\beta} + r_{\nu}^{(2)}a_2^{\beta} + \dots + r_{\nu}^{(n)}a_n^{\beta}}{r_{\nu}^{(1)} + r_{\nu}^{(2)} + \dots + r_{\nu}^{(n)}} \right)^{\frac{1}{\beta}} \quad (\nu=1, 2, \dots).$$

由於上述不等式對任何自然數 ν 都是正確的，所以，命 $\nu \rightarrow \infty$ ，上述不等式依然正確，這時我們有

$$\begin{aligned} & \left(\frac{q_1a_1^{\alpha} + q_2a_2^{\alpha} + \dots + q_na_n^{\alpha}}{q_1 + q_2 + \dots + q_n} \right)^{\frac{1}{\alpha}} \\ & \leq \left(\frac{q_1a_1^{\beta} + q_2a_2^{\beta} + \dots + q_na_n^{\beta}}{q_1 + q_2 + \dots + q_n} \right)^{\frac{1}{\beta}}, \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad M_{\alpha}(a, q) \leq M_{\beta}(a, q).$$

這樣我們就對任何正實數 q_1, q_2, \dots, q_n 証得了定理四。從證明的过程顯然可知，等號只有當 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 時才能成立。

上述證明體現了一個重要的方法。有些定理對一般的實數證明起來比較困難，而對有理數證明起來却比較容易。在這種情況下，我們往往用有理數來逼近實數，然後通過極限手續來獲得所要証的結果。事實上，這種方法在證明定理二時我們已經用過了。

如果取 $\alpha=0, \beta=1$ ，我們有

$$M_0(a, q) \leq M_1(a, q),$$

即

$$(a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n})^{\frac{1}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n}} \leq \frac{q_1 a_1 + q_2 a_2 + \cdots + q_n a_n}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n}, \quad (5)$$


或者

$$a_1^{q_1} a_2^{q_2} \cdots a_n^{q_n} \leq \left(\frac{q_1 a_1 + q_2 a_2 + \cdots + q_n a_n}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n} \right)^{q_1 + q_2 + \cdots + q_n}.$$

这个不等式用处很大, 它是定理一的直接推广 (如取 $q_1 = q_2 = \cdots = q_n = 1$ 就得到定理一了).

最后我們來解釋一下加权平均概念在力学上的意义.

如果在直線上坐标分別是 x_1 和 x_2 的两点 A 和 B 处各放有一个質点, 它們的質量分別是 m_1 和 m_2 . 我們要計算由这两个質点所构成的質点系的重心 G 的坐标 x_G .



显然, 重心 G 一定在

图 7.

A, B 的联线上. 我們把联線 AB 想象成一条几乎沒有重量的硬金属絲. 这时如果用鉛筆尖在 G 点处把它頂住的話, 那么質点 m_1 和 m_2 在重力作用下應該象一架天平秤一样保持平衡. 因此有

$$\overline{AG} m_1 g = \overline{GB} m_2 g.$$

但

$$\overline{AG} = x_G - x_1, \quad \overline{GB} = x_2 - x_G,$$

代入上式即得 $m_1(x_G - x_1) = m_2(x_2 - x_G)$,

解之即得

$$x_G = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2} = p_1 x_1 + p_2 x_2.$$

也就是说，重心坐标是这两个质点坐标的加权平均，而加权系数是

$$p_1 = \frac{m_1}{m_1 + m_2}, \quad p_2 = \frac{m_2}{m_1 + m_2}.$$

上面我們算出了由两个质点所构成的质点系的重心坐标。現在我們問，对于一般由任意 n 个质点所构成的质点系




图 8.

的重心坐标是否也有类似的公式？換句話說，在直線上任意給

出 n 个质点 A_1, A_2, \dots, A_n ，它們的坐标和质量分別是：

$$x_1, x_2, \dots, x_n; \quad m_1, m_2, \dots, m_n,$$

那么由这 n 个质点所构成的质点系的重心坐标 x_G 是否可写成

$$x_G = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} \quad (6)$$

下面我們用数学归纳法来証明这个公式的正确性。




图 9.

当只有两个质点，也即 $n=2$ 时这个公式是成立的。今設 $n=k$ 时上式成立，要推出

$n=k+1$ 时上式也真。

設 \bar{A} 是由 A_1, A_2, \dots, A_k 所构成的质点系的重心，用 $x_G^{(k)}$ 記它的坐标，那么由归纳法假定知：

$$x_G^{(k)} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \cdots + m_k x_k}{m_1 + m_2 + \cdots + m_k}.$$


現在我們可以用坐标为 $x_G^{(k)}$ 、質量是 $m_1 + m_2 + \cdots + m_k$ 的質点 \bar{A} 来代替全部 k 个質点 A_1, A_2, \dots, A_k , 而求整个 $k+1$ 个質点 $A_1, A_2, \dots, A_k, A_{k+1}$ 的重心坐标就归結为計算質点 \bar{A} 和 A_{k+1} 的重心坐标, 所以有

$$\begin{aligned} x_G^{(k+1)} &= \frac{(m_1 + m_2 + \cdots + m_k)x_G^{(k)} + m_{k+1}x_{k+1}}{(m_1 + m_2 + \cdots + m_k) + m_{k+1}} \\ &= \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \cdots + m_k x_k + m_{k+1} x_{k+1}}{m_1 + m_2 + \cdots + m_k + m_{k+1}}, \end{aligned}$$

因此 $n=k+1$ 时公式(6)也成立。这就証明了对任意 n 个質点公式(6)都是正确的。也就是说由任意 n 个質点所构成的質点系的重心坐标是这 n 个質点的坐标的加权平均，而加权系数是

$$\begin{aligned} p_1 &= \frac{m_1}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n}, \quad p_2 = \frac{m_2}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n}, \\ &\cdots, \quad p_n = \frac{m_n}{m_1 + m_2 + \cdots + m_n}. \end{aligned}$$

公式(6)可以帮我們推出某些求和公式。

在数軸上取
坐标分别是 

$1, 2, 3, \dots, n$

图 10.

的 n 个点 A_1, A_2, \dots, A_n , 并在这些点上分別放置質量 $C_n^1, C_n^2, \dots, C_n^n$, 在坐标原点 O 放置質量 C_n^0 , 这里的 C_n^k ($k=0, 1, 2, \dots, n$) 表組合数。这样我們就得到由 $n+1$ 个質点构成的質点系。

大家知道組合数滿足关系

$$C_n^k = C_n^{n-k} \quad (k=0,1,2,\dots,n),$$

因此 O 点的質量 C_n^0 和 A_n 点的質量 C_n^n 是相同的, A_1 点的質量 C_n^1 和 A_{n-1} 点的質量 C_n^{n-1} 是相同的, 依此类推。不難知道, 整个質點系的質量分布对于綫段 OA_n 的中点是对称的。因此, 这質點系的重心就是綫段 OA_n 的中点。由于 $\overline{OA_n} = n$, 所以重心坐标是 $\frac{n}{2}$ 。另一方面, 根据公式(6)知道, 这个質點系的重心坐标也可写为

$$\frac{0 \cdot C_n^0 + 1 \cdot C_n^1 + 2 \cdot C_n^2 + \cdots + n \cdot C_n^n}{C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n}.$$

联合这两結果, 即得

$$\frac{0 \cdot C_n^0 + 1 \cdot C_n^1 + 2 \cdot C_n^2 + \cdots + n \cdot C_n^n}{C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n} = \frac{n}{2}.$$

由二項式定理容易知道

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^n = 2^n,$$

把这結果代入上式, 便可得出下面的求和公式:

$$1 \cdot C_n^1 + 2 \cdot C_n^2 + \cdots + n \cdot C_n^n = n \cdot 2^{n-1}.$$

根据同样的道理, 并利用公式

$$\sin k \frac{\pi}{n} = \sin (n-k) \frac{\pi}{n} \quad (k=0,1,2,\dots,n),$$

$$\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} = \cot \frac{\pi}{2n},$$

不難証明

$$\begin{aligned} 1 \cdot \sin \frac{\pi}{n} + 2 \cdot \sin \frac{2\pi}{n} + \cdots + (n-1) \sin \frac{(n-1)\pi}{n} + n \sin \frac{n\pi}{n} \\ = \frac{n}{2} \cot \frac{\pi}{2n}. \end{aligned}$$

习 题

1. 設 x, y, z 都是正數，且 $x+2y+3z=12$ ，試証：

$$x^2+2y^2+3z^2>24.$$

2. 設 x, y, z 都是正數，試証：

$$\left(\frac{x+y+z}{3}\right)^{x+y+z} \leq x^x y^y z^z \leq \left(\frac{x^2+y^2+z^2}{x+y+z}\right)^{x+y+z}.$$

3. 試証对于任何正數 a_1, a_2, a_3, a_4 ，恒有不等式

$$a_1 a_2^2 a_3^3 a_4^4 \leq \left(\frac{a_1+2a_2+3a_3+4a_4}{10}\right)^{10}.$$

4. 試証不等式：

$$1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \cdot 4^4 \cdots n^n \leq \left(\frac{2n+1}{3}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

5. 試証不等式：

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{4} \cdot \sqrt[8]{8} \cdots \sqrt[2^n]{2^n} < n+1.$$

6. 設 x, y, z 都是正數，且 $x+y+z=2$ ，試証：

$$x^x y^y z^z \geq \frac{4}{9}.$$

7. 設 p, q, r, x 都是正數，試証：

$$px^{q-p} + qx^{r-q} + rx^{p-r} \geq p + q + r.$$

8. 設 $a_1, a_2, \dots, a_n; q_1, q_2, \dots, q_n; \alpha, \beta$ 都是正數，且 $\gamma = \alpha + \beta$ ，試証：

$$\begin{aligned} & \frac{q_1 a_1^\gamma + q_2 a_2^\gamma + \cdots + q_n a_n^\gamma}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n} \\ & \geq \frac{q_1 a_1^\alpha + q_2 a_2^\alpha + \cdots + q_n a_n^\alpha}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n} \cdot \frac{q_1 a_1^\beta + q_2 a_2^\beta + \cdots + q_n a_n^\beta}{q_1 + q_2 + \cdots + q_n}. \end{aligned}$$

9. 設 $x, y, z; p, q, r$ 都是正數，且 $p+q+r=1$ ，試証：當 $n \geq 1$ 時有：

$$px^n + qy^n + rz^n \geq x^p y^q z^r (px^{n-1} + qy^{n-1} + rz^{n-1}).$$

10. 設 $x_i > 0, \alpha_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 且 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = c$, 試証
函數

$$x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n}$$

當 $\frac{x_1}{\alpha_1} = \frac{x_2}{\alpha_2} = \cdots = \frac{x_n}{\alpha_n} = \frac{c}{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n}$

時取最大值。

11. 設 $a_i > 0, x_i > 0, \alpha_i > 0, \beta_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 且

$$a_1 x_1^{\beta_1} + a_2 x_2^{\beta_2} + \cdots + a_n x_n^{\beta_n} = c,$$

試証函數

$$x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n}$$

當 $\frac{\beta_1 a_1 x_1^{\beta_1}}{\alpha_1} = \frac{\beta_2 a_2 x_2^{\beta_2}}{\alpha_2} = \cdots = \frac{\beta_n a_n x_n^{\beta_n}}{\alpha_n}$

時取最大值。

12. 設 $x_i > 0 (i=1, 2, \dots, n)$, 且 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1$, 試証函數

$$x_1^{x_1} x_2^{x_2} \cdots x_n^{x_n}$$

當 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = \frac{1}{n}$

時取最小值 $\frac{1}{n}$ 。

附录 习题解答或提示

第三节

1. 利用定理一的不等式，使式中等号成立即得。
2. 把它弯成边长为 $\frac{l}{4}$ 的正方形。
3. 设圆半径是 R ，那么圆内接矩形的面积可写为

$$\begin{aligned}S &= (2R\cos\theta)(2R\sin\theta) \\&= 2R^2\sin 2\theta,\end{aligned}$$

所以当 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时，即这个矩形是正方形时，




图 11.

S 有最大值。

也可利用定理一找出使

$$S^2 = 16R^4\sin^2\theta\cos^2\theta$$

取最大值的 θ 。

4. 把 16 分成四个相等数之和，即 $16 = 4 + 4 + 4 + 4$ ，它们的乘积有最大值。
5. 圆柱形的底半径 $R = 1$ 米，高 $H = 1.5$ 米。
6. $\theta = \arctg \sqrt{2}$ 。
7. 至少需要 40 米长。
8. 设圆锥的高是 h ，底半径是 r ，容积 $V_0 = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ ，侧面积 $S = \pi r \sqrt{r^2 + h^2}$ 。根据定理一，

$$\begin{aligned}
 S^2 &= \pi^2 r^2 (r^2 + h^2) = \pi^2 r^4 + \frac{1}{2} \pi^2 r^2 h^2 + \frac{1}{2} \pi^2 r^2 h^2 \\
 &\geq 3 \sqrt[3]{(\pi^2 r^4) \cdot (\frac{1}{2} \pi^2 r^2 h^2) \cdot (\frac{1}{2} \pi^2 r^2 h^2)} \\
 &= 3 \sqrt[3]{\frac{1}{4} \pi^6 r^8 h^4} = 3 \sqrt[3]{\frac{81}{4} \pi^2 V_0^4} = \text{常数.}
 \end{aligned}$$

当 $\pi^2 r^4 = \frac{1}{2} \pi^2 r^2 h^2 = \frac{1}{2} \pi^2 r^2 h^2$ 时, S^2 有最小值. 解上面这个等式得 $h = r\sqrt{\frac{1}{2}}$.

第四节

1. 用定理一以及恒等式 $1+2+3+\cdots+2n=n(2n+1)$.
2. 用定理一即得.
3. 利用 $a+b+c \geq 3\sqrt[3]{abc}$, $a^2+b^2+c^2 \geq 3\sqrt[3]{(abc)^2}$.
4. 利用推論一.
5. 把 $\frac{x^2+5}{\sqrt{x^2+4}}$ 写成 $\sqrt{x^2+4} + \frac{1}{\sqrt{x^2+4}}$, 然后应用推論一.
6. 利用不等式

$$x^4+y^4 \geq 2x^2y^2, \quad y^4+z^4 \geq 2y^2z^2, \quad z^4+x^4 \geq 2z^2x^2$$

即可証得左半的不等式. 右半不等式可仿同法証得.

7. 題中的不等式等价于

$$(b+c)(c+a)(a+b) \geq 8abc.$$

8. 利用推論二.
9. 仿照第四节的例 3 来做.
10. 这是上題 $n=3$ 的特殊情況. 根據第 9 題, 我們有

$$\frac{a+b+c}{b+c} + \frac{a+b+c}{c+a} + \frac{a+b+c}{a+b} \geq \frac{9}{2},$$

即 $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} + 3 \geq \frac{9}{2}$,

移項，即得所要証明的不等式。

11. 利用定理一得

$$(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n) \leq \left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^n = \left(1+\frac{S}{n}\right)^n.$$

利用牛頓二項式定理把 $\left(1+\frac{S}{n}\right)^n$ 展開，即可得所要証明的不等式。

第五節

1. 由于 $M_3(x,y,z) \geq M_2(x,y,z)$ ，所以有

$$\left(\frac{x^2+y^2+z^2}{3}\right)^{\frac{1}{2}} \geq \left(\frac{x^2+y^2+z^2}{3}\right)^{\frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{8}{3}},$$

即

$$x^2+y^2+z^2 \geq 16\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

2. 用不等式 $M_2(x,y,z) \leq M_4(x,y,z)$ 。

3. 用不等式 $M_3(x,y,z) \geq M_1(x,y,z)$ 。

4. 当 $a \geq 1$ 时，由 $M_\alpha(a) \geq M_1(a)$ ，得

$$\left(\frac{a_1^\alpha+a_2^\alpha+\cdots+a_n^\alpha}{n}\right)^{\frac{1}{\alpha}} \geq \frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n},$$

或者 $\left(\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}\right)^\alpha \leq \frac{a_1^\alpha+a_2^\alpha+\cdots+a_n^\alpha}{n}.$

不等式兩端同乘以 n^α ，即得所要証的不等式。同样道理，可以証明 $0 < \alpha \leq 1$ 时的情况。

特別，如果取 $n=2$ ，便得：

$$(a_1+a_2)^\alpha \leq 2^{\alpha-1}(a_1^\alpha+a_2^\alpha), \quad \alpha \geq 1;$$

$$(a_1+a_2)^\alpha \geq 2^{\alpha-1}(a_1^\alpha+a_2^\alpha), \quad 0 < \alpha \leq 1.$$

5. 用不等式 $M_3(a,b,c,d) \leq M_6(a,b,c,d)$ ，

6. 利用定理三証明

$$M_\gamma^\gamma(a) \geq M_\alpha^\alpha(a) M_\beta^\beta(a).$$

7. 利用第 6 題的不等式即得。

8. 利用第 6 題的不等式和 $\frac{x^2+y^2+z^2}{3} \geq xyz$.

9. 因为 $M_2(a+\frac{1}{a}, b+\frac{1}{b}) \geq M_1(a+\frac{1}{a}, b+\frac{1}{b})$,

$$\text{即 } \left(\frac{\left(a+\frac{1}{a}\right)^2 + \left(b+\frac{1}{b}\right)^2}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \geq \frac{\left(a+\frac{1}{a}\right) + \left(b+\frac{1}{b}\right)}{2} = \frac{1+\frac{1}{a}+\frac{1}{b}}{2}.$$

$$\text{又因 } (a+b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) \geq 4,$$

$$\text{所以 } \frac{1}{a}+\frac{1}{b} \geq 4,$$

把这結果代入上面的不等式, 得:

$$\left(\frac{\left(a+\frac{1}{a}\right)^2 + \left(b+\frac{1}{b}\right)^2}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \geq \frac{5}{2}.$$

不等式两端平方再同乘以 2, 即得所要証明的不等式.

10. 用不等式

$$M_2\left(a+\frac{1}{a}, b+\frac{1}{b}, c+\frac{1}{c}\right) \geq M_1\left(a+\frac{1}{a}, b+\frac{1}{b}, c+\frac{1}{c}\right)$$

和推論二.

11. 这是第 9 題結果的推广, 証法和上題一样. 利用

$$\begin{aligned} M_m\left(a_1+\frac{1}{a_1}, a_2+\frac{1}{a_2}, \dots, a_n+\frac{1}{a_n}\right) \\ \geq M_1\left(a_1+\frac{1}{a_1}, a_2+\frac{1}{a_2}, \dots, a_n+\frac{1}{a_n}\right) \end{aligned}$$

和推論二即得.

12. 当 $\alpha > 1$ 时, $M_\alpha(x) \geq M_1(x)$, 即

$$\left(\frac{x_1^\alpha+x_2^\alpha+\dots+x_n^\alpha}{n} \right)^{\frac{1}{\alpha}} \geq \frac{x_1+x_2+\dots+x_n}{n} = \frac{\sigma}{n}.$$

即

$$x_1^\alpha + x_2^\alpha + \cdots + x_n^\alpha \geq n \left(\frac{c}{n} \right)^\alpha.$$

上述等号当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = \frac{c}{n}$ 时成立。所以当 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = \frac{c}{n}$ 时 $x_1^\alpha + x_2^\alpha + \cdots + x_n^\alpha$ 取最小值 $n \left(\frac{c}{n} \right)^\alpha$ 。

第六节

1. 在不等式

$$\left(\frac{q_1 a_1^2 + q_2 a_2^2 + q_3 a_3^2}{q_1 + q_2 + q_3} \right)^{\frac{1}{2}} \geq \frac{q_1 a_1 + q_2 a_2 + q_3 a_3}{q_1 + q_2 + q_3}$$

中取 $q_1=1, q_2=2, q_3=3; a_1=x, a_2=y, a_3=z$ 即得。

2. 在不等式 $M_0(a, q) \leq M_1(a, q)$ 中取 $n=3$ 即得：

$$(a_1^{q_1} a_2^{q_2} a_3^{q_3})^{\frac{1}{q_1+q_2+q_3}} \leq \frac{q_1 a_1 + q_2 a_2 + q_3 a_3}{q_1 + q_2 + q_3},$$

或者 $a_1^{q_1} a_2^{q_2} a_3^{q_3} \leq \left(\frac{q_1 a_1 + q_2 a_2 + q_3 a_3}{q_1 + q_2 + q_3} \right)^{q_1 + q_2 + q_3}.$

在上面这个不等式中取

$$a_1 = q_1 = x, a_2 = q_2 = y, a_3 = q_3 = z,$$

得 $x^x y^y z^z \leq \left(\frac{x^2 + y^2 + z^2}{x + y + z} \right)^{x+y+z},$

这就是所要証明的不等式的右半。如果在上面这同一个不等式中取

$$q_1 = x, a_1 = \frac{1}{x}; q_2 = y, a_2 = \frac{1}{y}; q_3 = z, a_3 = \frac{1}{z},$$

那么 $\frac{1}{x^x y^y z^z} \leq \left(\frac{3}{x+y+z} \right)^{x+y+z}.$

不等式两端取倒数，即得：

$$x^x y^y z^z \geq \left(\frac{x+y+z}{3} \right)^{x+y+z}.$$

3. 应用推广的定理一，即不等式 $M_0(a, q) \leq M_1(a, q)$ 。

4. 应用推广的定理一, 即不等式 $M_0(a, q) \leq M_1(a, q)$,

5. 把不等式的左端写成

$$1^{\alpha} 2^{\frac{1}{2}} (2^2)^{\frac{1}{2^2}} \cdots (2^n)^{\frac{1}{2^n}},$$

这儿 α 可以是任何正数. 由推广的定理一得:

$$\begin{aligned} & 1^{\alpha} 2^{\frac{1}{2}} (2^2)^{\frac{1}{2^2}} \cdots (2^n)^{\frac{1}{2^n}} \\ & \leq \left(\frac{\alpha + \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2^2} \cdot 2^2 + \cdots + \frac{1}{2^n} \cdot 2^n}{\alpha + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n}} \right) \alpha + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} \\ & = \left(\frac{\alpha + n}{\alpha + 1 - \frac{1}{2^n}} \right) \alpha + 1 - \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

在上面这个不等式中令 $\alpha = \frac{1}{2^n}$ 即得

$$2^{\frac{1}{2}} (2^2)^{\frac{1}{2^2}} \cdots (2^n)^{\frac{1}{2^n}} \leq n + \frac{1}{2^n} < n + 1.$$

这就是所要证明的不等式.

6. 利用第 2 题的结果.

7. 在不等式

$$a_1^{q_1} a_2^{q_2} a_3^{q_3} \leq \left(\frac{q_1 a_1 + q_2 a_2 + q_3 a_3}{q_1 + q_2 + q_3} \right)^{q_1 + q_2 + q_3}$$

中取 $q_1 = p$, $q_2 = q$, $q_3 = r$; $a_1 = x^{q-r}$, $a_2 = x^{r-p}$, $a_3 = x^{p-q}$ 即得.

8. 利用定理四证明

$$M_{\gamma}^{\gamma}(a, q) \geq M_{\alpha}^{\alpha}(a, q) M_{\beta}^{\beta}(a, q).$$

9. 利用上题的结果以及推广的定理一.

10. 应用推广的定理一有:

$$\begin{aligned}
 & \left(\frac{x_1}{\alpha_1}\right)^{\alpha_1} \left(\frac{x_2}{\alpha_2}\right)^{\alpha_2} \cdots \left(\frac{x_n}{\alpha_n}\right)^{\alpha_n} \\
 & \leq \left(\frac{\alpha_1 \frac{x_1}{\alpha_1} + \alpha_2 \frac{x_2}{\alpha_2} + \cdots + \alpha_n \frac{x_n}{\alpha_n}}{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n} \right)^{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n} \\
 & = \left(\frac{c}{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n} \right)^{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n}
 \end{aligned}$$

即

$$x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n} \leq \alpha_1^{\alpha_1} \alpha_2^{\alpha_2} \cdots \alpha_n^{\alpha_n} \left(\frac{c}{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n} \right)^{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n}$$

上式右端是和 x_i ($i=1, 2, \dots, n$) 无关的常数。所以使上式等号成立的 x_i 值就使 $x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n}$ 取到最大值。而要这等式的等号成立也就是要上一个不等式的等号成立，所以有

$$\frac{x_1}{\alpha_1} = \frac{x_2}{\alpha_2} = \cdots = \frac{x_n}{\alpha_n} = \frac{c}{\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n}.$$

II. 由推广的定理一得：

$$\begin{aligned}
 & \left(\frac{\beta_1 \alpha_1 x_1^{\beta_1}}{\alpha_1} \right)^{\frac{\alpha_1}{\beta_1}} \left(\frac{\beta_2 \alpha_2 x_2^{\beta_2}}{\alpha_2} \right)^{\frac{\alpha_2}{\beta_2}} \cdots \left(\frac{\beta_n \alpha_n x_n^{\beta_n}}{\alpha_n} \right)^{\frac{\alpha_n}{\beta_n}} \\
 & \leq \left(\frac{\alpha_1 x_1^{\beta_1} + \alpha_2 x_2^{\beta_2} + \cdots + \alpha_n x_n^{\beta_n}}{\frac{\alpha_1}{\beta_1} + \frac{\alpha_2}{\beta_2} + \cdots + \frac{\alpha_n}{\beta_n}} \right)^{\frac{\alpha_1}{\beta_1} + \frac{\alpha_2}{\beta_2} + \cdots + \frac{\alpha_n}{\beta_n}} \\
 & = \left(\frac{c}{\frac{\alpha_1}{\beta_1} + \frac{\alpha_2}{\beta_2} + \cdots + \frac{\alpha_n}{\beta_n}} \right)^{\frac{\alpha_1}{\beta_1} + \frac{\alpha_2}{\beta_2} + \cdots + \frac{\alpha_n}{\beta_n}}
 \end{aligned}$$

即

$$x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2}$$

上式右端是和 x_i ($i=1, 2, \dots, n$) 的常数。所以只須使上式等号成立就行，即

$$\frac{\beta_1 \alpha_1 x_1^{\beta_1}}{\alpha_1} = \frac{\beta_2 \alpha_2 x_2^{\beta_2}}{\alpha_2} = \dots = \frac{\beta_n \alpha_n x_n^{\beta_n}}{\alpha_n}.$$

12. 仿第 2 標左半不等式的証法，證明不等式

$$x_1^{x_1} x_2^{x_2} \cdots x_n^{x_n} \geq \left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \right)^{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}$$

即得。